Enfamil™*mc

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

Centre de renseignements aux hôpitaux: 1 800 263-1143
Bureau des commandes: 1 877 307-2984

Mead Johnson Nutrition™mc

Mise à jour : août 2015 • Réservé aux professionnels médicaux canadiens.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1278790 - préparation en poudre, 663 g
1278789 - 2 x 496 g (992 g)
2005350 - préparation prête à l'emploi, 237 mL
1269807 - liquide concentré, 385 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+®

Préparation initiale courante à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons nés à terme et en santé. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,35	10,1
% du total des calories	8	8
Source : Concentréde protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	7,6	57
% du total des calories	44	44
Galacto-oligosaccharides (g)	0,2	1,52
Polydextrose (g)	0,2	1,52
Source : Lactose, galacto-oligosaccharides, polydextrose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,051 (pdr & PAS) 0,05 (conc)	0,38
ARA (mg)	23	172
ADH (mg)	11,5 (pdr & PAS) 11,4 (conc)	86
Minéraux		
Calcium (mg)	53	390
Phosphore (mg)	29	220
Magnésium (mg)	5,4	40
Fer (mg)	1,22 (pdr & PAS) 1,21 (conc)	9,1
Zinc (mg)	0,68 (pdr & PAS) 0,67 (conc)	5,1
Manganèse (mg)	0,0101 (conc & PAS) 0,0102 (pdr)	0,076
Cuivre (mg)	0,051 (pdr & PAS) 0,05 (conc)	0,38
Iode (mg)	0,0101 (conc & PAS) 0,0102 (pdr)	0,076
Sélénium (mg)	0,00189 (pdr & PAS) 0,00188 (conc)	0,0141
Sodium (mg)	18,2 (conc & PAS) 18,3 (pdr)	136

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43 (pdr & PAS) 42 (conc)	320
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1520
Vitamine D (UI)	41 (pdr & PAS) 40 (conc)	300
Vitamine E (UI)	1,35	10,1
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,095 (pdr & PAS) 0,094 (conc)	0,71
Niacine (mg)	0,068 (pdr & PAS) 0,067 (conc)	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041 (pdr & PAS) 0,04 (conc)	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,081
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00152
Biotine (mg)	0,002	0,0152
Choline (mg)	16,2	121
Inositol (mg)	4,1 (pdr & PAS) 4 (conc)	30
Carnitine	1,35	10,1
Taurine (mg)	4,1 (pdr & PAS) 4 (conc)	30
Nucléotides (mg)	2,8	21
Autres Caractéristiques		
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL) [1]		12,5
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)		300
Osmolarité (mOsm/L)		270
Eau (g/100 mL)		90

» Mode d'emploi (poudre)
» Mode d'emploi (concentré)
» Mode d'emploi (prête à l'emploi)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1274014 - préparation en poudre, 900 g
1015435 - liquide concentré, 385 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® Plus Faible en Fer
que les autres préparations Enfamil®

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé. Préparation à teneur plus faible en fer que les autres marques*, **enrichie de 7,4 mg/L de fer,** conformément aux recommandations des experts quant à la composition des préparations[1,2].

* Enfamil A+®, Enfamil® : 12,2 mg/L; Similac® avec oméga 3 et oméga 6 : 12 mg/L; Nestlé® Bon Départ®, Nestlé® Bon Départ® avec oméga 3 et oméga 6 : 10 mg/L. Données tirées des étiquettes de produits canadiens, achetés au mois de novembre 2012.

Analyse	par100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,42	10,8
% du total des calories	8,5	8,5
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	7,4	56
% du total des calories	43,5	43,5
Source : Lactose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)		
Acide linoléique (g)	0,58 (pdr) 0,54 (liq)	4,4
Acide linolénique (g)	0,054	0,41
Minéraux		
Calcium (mg)	53	400
Phosphore (mg)	29	220
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	0,74	5,6
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	18,3	138
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43	320

Analyse	par100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1540
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,72
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00154
Biotine (mg)	0,002	0,0154
Choline (mg)	16,2	123
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31
Nucléotides (mg)	2,8	22

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[3]	12,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi (poudre)

» Mode d'emploi (concentré)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[4]. »

1. Raiten DJ, et al. Eds. Life Sciences Research Office. Assessment of nutrient requirements for infant formulas. J Nutr. 1998;128(11S):2059S-2294S. 2. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 3. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1274015 - préparation en poudre, 900 g
1015439 - liquide concentré, 385 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil®

Préparation initiale courante à base de lait de vache, enrichie de fer, conçue pour les nourrissons nés à terme et en santé.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,42	10,8
% du total des calories	8,5	8,5
Source : Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum		
Glucides (g)	7,4	56
% du total des calories	43,5	43,5
Source : Lactose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)		
Acide linoléique (g)	0,58 (pdr) 0,54 (liq)	4,4
Acide linolénique (g)	0,054	0,41
Minéraux		
Calcium (mg)	53	400
Phosphore (mg)	29	220
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	18,3	138
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43	320

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1540
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0054 (pdr) 0,0061 (liq)	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,72
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00154
Biotine (mg)	0,002	0,0154
Choline (mg)	16,2	123
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31
Nucléotides (mg)	2,8	22

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	12,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi (poudre)

» Mode d'emploi (concentré)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1171320 - préparation en poudre, 363 g
0,74 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® EnfaCare®

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l'hôpital. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	74/310	490/2060
Protéines (g)	2,1	13,8
% du total des calories	11	11
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	7,7	51
% du total des calories	42	42
Source : Lactose, extraits secs de sirop de maïs		
Matières grasses (g)	3,9	26
% du total des calories	47	47
Source : Huile végétale à forte teneur en acide oléique (34 %), huile de soya (29 %), huile TCM (20 %), huile de noix de coco (14 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,64	4,2
Acide linolénique (g)	0,07	0,47
ARA (mg)	25	168
ADH (mg)	12,6	84
Minéraux		
Calcium (mg)	89	590
Phosphore (mg)	49	330
Magnésium (mg)	5,9	39
Fer (mg)	1,33	8,9
Zinc (mg)	0,74	4,9
Manganèse (mg)	0,0111	0,074
Cuivre (mg)	0,089	0,59
Iode (mg)	0,0155	0,104
Sélénium (mg)	0,0021	0,0138
Sodium (mg)	27	182
Potassium (mg)	78	520
Chlorure (mg)	58	380

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	330	2200
Vitamine D (UI)	52	350
Vitamine E (UI)	3	20
Vitamine K (mg)	0,0059	0,039
Vitamine C (mg)	11,8	79
Thiamine (mg)	0,148	0,99
Riboflavine (mg)	0,148	0,99
Niacine (mg)	0,74	4,9
Acide pantothénique (mg)	0,63	4,2
Vitamine B_6 (mg)	0,044	0,3
Acide folique (mg)	0,0192	0,128
Vitamine B_{12} (mg)	0,00022	0,00148
Biotine (mg)	0,0037	0,025
Choline (mg)	17,8	118
Inositol (mg)	22	148
Carnitine (mg)	1,48	9,9
Taurine (mg)	4,4	30
Nucléotides (mg)	3,1	21

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	18,4
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	310
Osmolarité (mOsm/L)	280
Eau (g/100 mL)	89

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
2014690 - préparation en poudre, 550 g
2014689 - 2 x 496 g (992 g)
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+® 2

Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus. Contient des teneurs en calcium, en fer et en protéines adaptée à l'âge. Contient aussi de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Protéines (g)	1,76	12,9
% du total des calories	10	10
Source : Lait écrémé		
Glucides (g)	7,3	54
% du total des calories	42	42
Galacto-oligosaccharides (g)	0,2	1,49
Polydextrose (g)	0,2	1,49
Source : Lactose, extraits secs de sirop de maïs, galacto-oligosaccharides, polydextrose		
Matières grasses (g)	3,6	26
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,052	0,38
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5	84
Minéraux		
Cendre (g)	0,68	5
Calcium (mg)	132	970
Phosphore (mg)	88	650
Magnésium (mg)	5,4	40
Fer (mg)	1,01	7,4
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0101	0,074
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0068	0,05
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg)	24	179
Potassium (mg)	88	650
Chlorure (mg)	54	400

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1490
Vitamine D (UI)	41	300
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,095	0,7
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,079
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	4,1	30
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30
Autres Caractéristiques		
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]		17,6
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)		270
Osmolarité (mOsm/L)		240
Eau (g/100 mL)		89

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
2015336 - liquide concentré, 385 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+® 2 (Concentré)

Préparation de transition à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

Analyse	par 100 mL dilution normale
Calories (kcal/kJ)	68 / 280
Protéines (g)	1,76
% du total des calories	10
Source : Lait écrémé	
Glucides (g)	7,7
% du total des calories	45
Galacto-oligosaccharides (g)	0,2
Polydextrose (g)	0,2
Source : Lactose, sirop de maïs, galacto-oligosaccharides, polydextrose	
Matières grasses (g)	3,4
% du total des calories	45
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Linoleic Acid (g)	0,55
Linolenic Acid (g)	0,047
Acide linoléique (g)	23
Acide linolénique (g)	11,5
Minéraux	
Cendre (g)	0,47
Calcium (mg)	80
Phosphore (mg)	53
Magnésium (mg)	5,5
Fer (mg)	1,01
Zinc (mg)	0,65
Manganèse (mg)	0,0108
Cuivre (mg)	0,058
Iode (mg)	0,0169
Sélénium (mg)	0,002
Sodium (mg)	27
Potassium (mg)	91
Chlorure (mg)	54

Analyse	par 100 mL dilution normale
Vitamines	
Vitamine A (UI)	210
Vitamine D (UI)	41
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,0061
Vitamine C (mg)	5,5
Thiamine (mg)	0,068
Riboflavine (mg)	0,088
Niacine (mg)	0,71
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,043
Acide folique (mg)	0,0128
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	12,2
Taurine (mg)	3,5

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,8
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	280
Osmolarité (mOsm/L)	250
Eau (g/100 mL)	90

- = n'en contient pas.

» Mode d'emploi (concentré)

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1274013 - préparation en poudre, 900 g
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® 2

Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2100
Protéines (g)	1,7	13
% du total des calories	10	10
Source : Lait écrémé		
Glucides (g)	7,4	55
% du total des calories	45	45
Source : Lactose, sirop de maïs		
Matières grasses (g)	3,4	25
% du total des calories	45	45
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)		
Acide linoléique (g)	0,6	4,6
Acide linolénique (g)	0,06	0,4
Minéraux		
Calcium (mg)	80	600
Phosphore (mg)	52	390
Magnésium (mg)	5,5	41
Fer (mg)	1,2	9
Zinc (mg)	0,6	4,8
Manganèse (mg)	0,01	0,06
Cuivre (mg)	0,06	0,4
Iode (mg)	0,02	0,1
Sélénium (mg)	0,002	0,02
Sodium (mg)	27	200
Potassium (mg)	90	680
Chlorure (mg)	60	450

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	208	1560
Vitamine D (UI)	40	300
Vitamine E (UI)	1,3	10
Vitamine K (mg)	0,006	0,05
Vitamine C (mg)	5,5	41
Thiamine (mg)	0,07	0,5
Riboflavine (mg)	0,07	0,5
Niacine (mg)	0,7	5,3
Acide pantothénique (mg)	0,3	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,04	0,3
Acide folique (mg)	0,01	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,0015
Biotine (mg)	0,002	0,02
Choline (mg)	11	80
Inositol (mg)	12	90
Carnitine (mg)	-	-
Taurine (mg)	4	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,6
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	n.d.
Osmolarité (mOsm/L)	n.d.
Eau (g/100 mL)	91

- = n'en contient pas
n.d. = non disponible

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1015429 - liquide concentré, 385 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® 2 (Concentré)

Préparation de transition pour nourrissons à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour les nourrissons âgés de 6 mois et plus.

Analyse	par 100 mL dilution normale
Calories (kcal/kJ)	68/280
Protéines (g)	1,76
% du total des calories	10
Source : Lait écrémé	
Glucides (g)	7,4
% du total des calories	44
Source : Lactose, sirop de maïs	
Matières grasses (g)	3,4
% du total des calories	46
Source : Oléine d'huile de palme (45 %), huile de soya (20 %), huile de noix de coco (20 %), huile de tournesol riche en acide oléique (15 %)	
Acide linoléique (g)	0,55
Acide linolénique (g)	0,047
Minéraux	
Calcium (mg)	80
Phosphore (mg)	53
Magnésium (mg)	5,5
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,65
Manganèse (mg)	0,0108
Cuivre (mg)	0,058
Iode (mg)	0,0169
Sélénium (mg)	0,002
Sodium (mg)	27
Potassium (mg)	91
Chlorure (mg)	54

Analyse	par 100 mL dilution normale
Vitamines	
Vitamine A (UI)	210
Vitamine D (UI)	41
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,006
Vitamine C (mg)	5,5
Thiamine (mg)	0,068
Riboflavine (mg)	0,088
Niacine (mg)	0,71
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,043
Acide folique (mg)	0,0129
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	12,2
Carnitine (mg)	-
Taurine (mg)	3,5

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,6
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	280
Osmolarité (mOsm/L)	250
Eau (g/100 mL)	90

- = n'en contient pas.

» Mode d'emploi (concentré)

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1278788 - préparation en poudre, 629 g
1278787 - 2 x 471 g (942 g)
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+ Gentlease®

Préparation de remplacement de premier choix à base de lait de vache et enrichie de fer conçue pour être facile à digérer*. Contient des protéines de lactosérum et de caséine partiellement hydrolysées, une teneur réduite en lactose† et de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100g
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,56	11,7
% du total des calories	9	9
Source : Lait écrémé partiellement hydrolysé et concentré de protéines de lactosérum		
Glucides (g)	7,3	55
% du total des calories	43	43
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4,1
Acide linolénique (g)	0,049	0,37
ARA (mg)	23	173
ADH (mg)	11,5	87
Minéraux		
Calcium (mg)	55	420
Phosphore (mg)	31	230
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	24	184
Potassium (mg)	73	550
Chlorure (mg)	43	320

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1530
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,71
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00153
Biotine (mg)	0,002	0,0153
Choline (mg)	16,2	122
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	14
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	230
Osmolarité (mOsm/L)	210
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi (poudre)

* Semblable à toutes les préparations pour nourrissons. † Environ 1/5e de la quantité de lactose que l'on trouve dans une préparation courante à base de lait.
Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1177073- préparation en poudre, 660 g
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+® Épaissie

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et avec de l'amidon de riz pour les nourrissons qui régurgitent fréquemment ou qui ont besoin d'une préparation épaissie. Contient deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose) et de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Protéines (g)	1,69	12,4
% du total des calories	10	10
Source : Lait écrémé		
Glucides (g)	7,6	56
% du total des calories	44	44
Galacto-oligosaccharides	0,2	1,49
Polydextrose	0,2	1,49
Source : Lactose, amidon de riz, maltodextrine, galacto-oligosaccharides, polydextrose		
Matières grasses (g)	3,4	25
% du total des calories	46	46
Source : Oléine d'huile de palme (43,5 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,53	3,9
Acide linolénique (g)	0,047	0,35
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg)	53	390
Phosphore (mg)	36	260
Magnésium (mg)	5,4	40
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0101	0,075
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg)	27	200
Potassium (mg)	73	540
Chlorure (mg)	51	370

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1490
Vitamine D (UI)	41	300
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,095	0,7
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	4,1	30
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	15,3
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	230
Osmolarité (mOsm/L)	210
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1241233 - préparation en poudre, 730 g
1241760 - liquide concentré, 385 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+® Sans Lactose

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons sensibles au lactose. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3). Non destinée aux nourrissons ou aux enfants atteints de galactosémie.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,42	10,8
% du total des calories	8,5	8,5
Source : Isolats de protéines laitières		
Glucides (g)	7,4	56
% du total des calories	43,5	43,5
Source : Extraits secs de sirop de maïs		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5%)		
Acide linoléique (g)	0,58	4,4
Acide linolénique (g)	0,054	0,41
ARA (mg)	23	174
ADH (mg)	11,5	87
Minéraux		
Calcium (mg)	55	420
Phosphore (mg)	31	240
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,68	5,1
Manganèse (mg)	0,0101	0,077
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,077
Sélénium (mg)	0,00189	0,0143
Sodium (mg)	20	154
Potassium (mg)	74	560
Chlorure (mg)	45	340

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1540
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,095	0,72
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,082
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00154
Biotine (mg)	0,002	0,0154
Choline (mg)	16,2	123
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31
Nucléotides (mg)	2,8	22

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	13,2 (pdr) 13 (liq)
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	91

» Mode d'emploi (poudre)
» Mode d'emploi (concentré)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1242610 - préparation en poudre, 730 g
0,68 kcal/mL
poudre: Ⓤ parève
Ingrédients préparés avec des installations laitières

Enfamil A+® Soya

Préparation à base de soya, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons qui ont besoin d'une préparation sans lait pour des raisons sanitaires ou culturelles. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Calories (kcal/kJ)	68/280	510/2130
Protéines (g)	1,69	12,7
% du total des calories	10	10
Source : Isolats de protéines de soya (avec ajout de L-méthionine)		
Glucides (g)	7,2	54
% du total des calories	42	42
Source : Extraits secs de sirop de maïs		
Matières grasses (g)	3,6	27
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5%)		
Acide linoléique (g)	0,54 (pdr)	4,1
Acide linolénique (g)	0.051 (pdr)	0,38
ARA (mg)	23	173
ADH (mg)	11,5	86
Minéraux		
Calcium (mg)	71	530
Phosphore (mg)	47	350
Magnésium (mg)	5,4	41
Fer (mg)	1,22	9,2
Zinc (mg)	0,81	6,1
Manganèse (mg)	0,0169	0,127
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,076
Sélénium (mg)	0,00189	0,0142
Sodium (mg)	24	183
Potassium (mg)	81	610
Chlorure (mg)	54	410

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1530
Vitamine D (UI)	41	310
Vitamine E (UI)	1,35	10,2
Vitamine K (mg)	0,0061	0,046
Vitamine C (mg)	8,1	61
Thiamine (mg)	0,054	0,41
Riboflavine (mg)	0,061	0,46
Niacine (mg)	0,68	5,1
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,31
Acide folique (mg)	0,0108	0,081
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00153
Biotine (mg)	0,002	0,0153
Choline (mg)	16,2	122
Inositol (mg)	4,1	31
Carnitine (mg)	1,35	10,2
Taurine (mg)	4,1	31

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	15,6
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	178 (pdr)
Osmolarité (mOsm/L)	160 (pdr)
Eau (g/100 mL)	90 (pdr)

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1239201 – préparation en poudre, 454 g
1241759 – préparation prête à l'emploi, 945 mL
0,68 kcal/mL Non casher

Nutramigen® A+®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des coliques*. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2080
Protéines (g)	1,89	13,9
% du total des calories	11	11
Source : Caséine hydrolysée, mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	7	51
% du total des calories	41	41
Source : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	3,6	26
% du total des calories	48	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,58	4,3
Acide linolénique (g)	0,054	0,4
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg)	64	470
Phosphore (mg)	35	260
Magnésium (mg)	5,4	40
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0169	0,124
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg)	32	230
Potassium (mg)	74	550
Chlorure (mg)	58	430

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g pdr
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1490
Vitamine D (UI)	34	250
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,061	0,45
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	11,5	85
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300 (pdr) 270 (liq)
Osmolarité (mOsm/L)	270 (pdr) 240 (liq)
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi (poudre)
» Mode d'emploi (prête à l'emploi)

* Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1233351 - préparation en poudre, 400 g
0.68 kcal/mL Non casher



PURAMINO™ A+®

Préparation hypoallergénique à base d'acides aminés libres (100 %) et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons et des tout-petits atteints d'une forme grave d'allergie aux protéines du lait de vache et d'allergies alimentaires multiples ou d'autres troubles nécessitant une préparation à base d'acides aminés. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et de l'huile TCM.

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	1,89	13,9
% du total des calories	11	11
Source: prémélange d'acides aminés		
Glucides (g)	7,2	53
% du total des calories	42	42
Source: Extraits secs de sirop de maïs, modifié amidon de manioc		
Matières grasses (g)	3,6	26
% du total des calories	47	47
Source : huile de tournesol riche en acide oléique (34,5%), huile de soya (30%), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,58	4,3
Acide linolénique (g)	0,054	0,4
ARA (mg)	23	169
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg)	64	470
Phosphore (mg)	35	260
Magnésium (mg)	7,4	55
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0169	0,124
Cuivre (mg)	0,051	0,37
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,0139
Sodium (mg)	32	230
Potassium (mg)	74	550
Chlorure (mg)	58	430

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	200	1490
Vitamine D (UI)	34	250
Vitamine E (UI)	1,35	9,9
Vitamine K (mg)	0,0061	0,045
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,061	0,45
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00149
Biotine (mg)	0,002	0,0149
Choline (mg)	16,2	119
Inositol (mg)	11,5	85
Carnitine (mg)	1,35	9,9
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	350
Osmolarité (mOsm/L)	320
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1238161 - préparation en poudre, 454 g
0,68 kcal/mL Non casher

Pregestimil® A+®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d'un trouble de malabsorption des graisses et pouvant être sensibles aux protéines entières. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Protéines (g)	1,89	14
% du total des calories	11	11
Source : Caséine hydrolysée, mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source : Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	3,8	28
% du total des calories	49	49
Source : Huile TCM (55 %), huile de maïs (10 %), huile de carthame riche en acide oléique (7,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,64	4,7
Acide linolénique (g)	0,064	0,48
ARA (mg)	23	170
ADH (mg)	11,5	85
Minéraux		
Calcium (mg)	64	470
Phosphore (mg)	35	260
Magnésium (mg)	5,4	40
Fer (mg)	1,22	9
Zinc (mg)	0,68	5
Manganèse (mg)	0,0169	0,125
Cuivre (mg)	0,051	0,38
Iode (mg)	0,0101	0,075
Sélénium (mg)	0,00189	0,014
Sodium (mg)	32	240
Potassium (mg)	74	550
Chlorure (mg)	58	430

Analyse	par 100 mL dilution normale	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	240	1750
Vitamine D (UI)	34	250
Vitamine E (UI)	2,7	20
Vitamine K (mg)	0,0081	0,06
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,054	0,4
Riboflavine (mg)	0,061	0,45
Niacine (mg)	0,68	5
Acide pantothénique (mg)	0,34	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,041	0,3
Acide folique (mg)	0,0108	0,08
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,0015
Biotine (mg)	0,002	0,015
Choline (mg)	16,2	120
Inositol (mg)	11,5	85
Carnitine (mg)	1,35	10
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	320
Osmolarité (mOsm/L)	280
Eau (g/100 mL)	88

» Mode d'emploi (poudre)

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour minimiser les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[2]. »

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14. 2. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
2015854 - préparation en poudre saveur de lait, 680 g
2015852 - préparation en poudre à la vanille, 680 g
Ⓤ D

Enfagrow® A+®

Supplément nutritionnel à base de lait de vache conçu pour les tout-petits âgés de 12 à 36 mois. Renferme 23 vitamines et minéraux, y compris des taux de calcium et de fer adaptés à l'âge, ainsi que de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

Analyse	Par portion de 200 mL reconstituée (36 g ou 4 mesures rases de poudre non tassée)
Calories (kcal/kJ)	160 / 670
Protéines (g)	6,4
Matières grasses (g)	6,3
Acide linoléique (g)	0,9
Acide linolénique (g)	0,1
Acides lipides saturés (g)	2,6
Docosahexaenoic acid (mg)	26
Glucides (g)	20
Galactooligosaccharides (g)	0,4
Polydextrose (g)	0,4
Sodium (mg)	80
Potassium (mg)	300
Vitamine A (RE)	250
Vitamine D (mg)	0,0009
Vitamine E (mg)	1,81
Vitamine C (mg)	10
Thiamine (mg)	0,3
Riboflavine (mg)	0,36
Niacine (NE)	5,8
Acide pantothénique (mg)	1,13
Vitamine B_6 (mg)	0,36

Analyse	Par portion de 200 mL reconstituée (36 g ou 4 mesures rases de poudre non tassée)
Folacine (mg)	0,057
Vitamine B_{12} (mg)	0,00032
Biotine (mg)	0,03
Calcium (mg)	250
Phosphore (mg)	187
Magnésium (mg)	38
Fer (mg)	2,5
Zinc (mg)	2,6
Manganèse (mg)	0,86
Cuivre (mg)	0,3
Iode (mg)	0,04
Chlore (mg)	180

% de la valeur quotidienne		
	Enfants de moins de 2 ans	Enfants de 2 ans et plus
Calcium	50%	25%
Fer	35%	20%

» Mode d'emploi (poudre)

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1015277 - 50 mL
Ⓤ D
NPN 00762881

Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)
Supplément de vitamine D

Indications

Supplément de vitamine D pour tous les nourrissons allaités nés à terme.

Le liquide D-Vi-Sol fournit aux nourrissons allaités de la vitamine D, qui joue un rôle dans la formation normale et la santé des os et des dents. Contribue à prévenir une carence en vitamine D.

Dans un énoncé conjoint, Santé Canada, la Société canadienne de pédiatrie et les Diététistes du Canada déclarent que la prise quotidienne d'un supplément de 10 µg (400 UI) de vitamine D est recommandée chez les nourrissons qui sont allaités exclusivement ou partiellement au sein, à partir de la naissance jusqu'à l'âge d'un an.

Bien-fondé et caractéristiques particulières

Le liquide D-Vi-Sol fournit 400 UI de vitamine D pour répondre à l'apport quotidien recommandé. Il ne contiennent ni sucre, ni gluten, ni lactose.

Posologie et administration

Posologie quotidienne pour tous les nourrissons allaités nés à terme : 1 mL (remplir la seringue jusqu'au repère de 1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Il est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d'autres aliments. La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1 mL)		
vitamine D_3	(cholécalciférol)	400 UI (10 µg)

Ingrédients non médicinaux

Glycérine, polysorbate 80, caramel, acide citrique anhydre, citrate de sodium dihydraté, hydroxyde de sodium, arôme artificiel et eau purifiée.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Précautions

Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Références

1. Santé Canada, de la Société canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada et du Comité canadien pour l'allaitement. La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de la naissance à six mois.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1015245 - 50 mL
Ⓤ D
NPN 00762903

Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide)

Supplément multivitaminique de vitamine A, D et C

Indications

Un supplément de vitamines A, D et C conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

Bien-fondé et caractéristiques particulières

Le supplément multivitaminique Enfamil Tri-Vi-Sol en liquide fournit 3 vitamines fréquemment prescrites, en quantités qui conviennent à l'administration quotidienne à des nourrissons et à des tout-petits.

Le supplément multivitaminique Enfamil Tri-Vi-Sol en liquide contient ni lactose ni gluten et est exempte d'édulcorant artificiel.

Posologie et administration

Posologie quotidienne : 1 mL (remplir la seringue jusqu'au repère de 1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Il est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d'autres aliments. La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1 mL) :	
vitamine C (acide ascorbique)	30 mg
vitamine A (palmitate de vitamine A)	750 UI (225 mcg d'EAR)
vitamine D_3 (cholécalciférol)	400 UI (10 mcg)

Ingrédients non médicinaux

Glycérine, eau purifiée, polysorbate 80, hydroxyde de sodium, arôme artificiel et couleur caramel.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Précautions

Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1015280 - 50 mL
Ⓤ D
NPN 00762946

Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)
Supplément multivitaminique

Indications

Un supplément multivitaminique conçu pour les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Pour maintenir en bonne santé les nourrissons et les tout-petits en pleine croissance.

Bien-fondé et caractéristiques particulières

Le supplément multivitaminique Enfamil Poly-Vi-Sol en liquide fournit 6 vitamines importantes et est indiqué lors de la transition de votre enfant ou votre tout-petits vers les aliments solides, pendant les poussées de croissance et chez l'enfant qui est difficile pour la nourriture.

Posologie et administration

Posologie quotidienne : 1 mL (remplir la seringue jusqu'au repère de 1,0 mL). Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.

Il est aussi possible de mélanger peu à peu le liquide dans une préparation pour nourrissons, du jus, des céréales ou d'autres aliments. La dose doit alors être administrée en une heure.

Ingrédients médicinaux (par 1 mL)	
vitamine C (acide ascorbique)	30 mg
niacinamide (niacinamide)	4 mg
riboflavine (riboflavine-5-phosphate de sodium)	0,6 mg
thiamine (chlorhydrate de thiamine)	0,5 mg
vitamine A (palmitate de vitamine A)	750 UI (225 mcg d'EAR)
vitamine D_3 (cholécalciférol)	400 UI (10 mcg)

Ingrédients non médicinaux

Glycérine, eau purifiée, polysorbate 80, colorant caramel et arômes de fruits.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Précautions

Garder ce médicament et tout autre médicament hors de la portée des enfant. Le flacon doit être gardé hors de la portée des enfants. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1015154 – 50 mL
Ⓤ D
NPN 00762954

Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)

Sulfate de fer, solution orale, U.S.P.

Indication
Aide à prévenir une carence en fer.

Nutriments

Les gouttes vitaminiques Fer-In-Sol contiennent	par 1,0 mL
Fer (sulfate ferreux heptahydraté)	75 mg
Équivalant à: en fer élémentaire	15 mg

Posologie et administration
Utilisez selon les directives du médicin de votre bébé. Pour administration orale.
Posologie : Pour les enfants de 0 à 2 ans. Prendre avec de la nourriture. Attendre quelques heures avant d'administrer ou après avoir administré un autre médicament. Administrer lentement dans la bouche de l'enfant, vers l'intérieur de la joue.
Dose tonique : De 0,5 à 1 mL par jour ou selon les directives de votre médecin.
Dose thérapeutique : 2,5 mL par jour ou selon les directives de votre médecin. Diviser en trois (3) doses et administrer trois (3) fois par jour.

Mises en garde et précautions : À la dose thérapeutique,certains enfants peuvent présenter de la constipation, de la diarrhée ou des vomissements. La décoloration temporaire des dents causée par ce liquide de fer peut être réduite à l'aide d'un bon brossage. Le liquide vitaminique FER-IN-SOL est généralement incolore, mais sa couleur peut varier, allant du vert bleuté à une couleur dorée. Toute couleur se situant dans cette gamme ne modifie pas l'activité du produit.
Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Ingrédients non médicinaux
Arôme naturel, acide citrique anhydre, alcool éthylique, bisulfite de sodium, solution de sorbitol, sucre et eau purifiée.

Effets secondaires
La prise de fer peut faire foncer les selles. Cet effet est normal et n'est pas préoccupant. Le liquide de fer peuvent noircir les dents des bébés, mais le bicarbonate de soude remédie à cette reaction inoffensive.

Précautions
Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé. Pour voie orale seulement. Conservez ce produit et tous les médicaments hors de la portée des enfants. Cet emballage renferme suffisamment de médicament pour avoir des effets nocifs graves chez un enfant. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Réactions indésirables
Certaines personnes peuvent présenter de la constipation, de la diarrhée ou des vomissements.

Surdosage ou ingestion accidentels
En cas de surdosage accidentel, avertissez immédiatement le médecin, un centre antipoison ou le service des urgences d'un hôpital.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1015278 - 250 mL
Ⓤ D
NPN 00017884

Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)
Sulfate der fer, solution orale, U.S.P.

Indications

Aide à prévenir une carence en fer.

Le sirop Fer-in-Sol est une préparation aux arômes de fruits sans alcool, sans lactose ni gluten.

Nutriments

Le sirop vitaminique Fer-In-Sol contient	Par 5 mL
Fer (sulfate ferreux heptahydraté)	150 mg
Équivalence en fer élémentaire	30 mg

Posologie et administration

Prendre quelques heures avant ou après la prise d'autre médicaments. Mélanger avec de l'eau ou du jus de fruits et prendre avec les repas.

Supplement	
Administrer une fois par jour, ou selon les directives de votre médecin.	
0 à 6 ans	1,25 mL
6 à 12 ans	2,5 mL
Adultes	5 mL

Carence	
Diviser en trois (3) doses et administrer trois (3) fois par jour, ou selon les directives de votre médecin.	
0 à 2 ans	2,5 à 5 mL
2 à 6 ans	5 mL
6 à 12 ans	5 à 12 mL
Adultes	10 à 15 mL

Ingrédients non médicinaux

Sucrose, solution de sorbitol, arôme naturel et artificiel, acide citrique anhydre, chlorure de sodium, bisulfite de sodium, acide sulfurique et eau purifiée.

Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 °C (59 à 86 °F).

Précautions

Conservez ce produit et tous les médicaments hors de la portée des enfants. Cet emballage renferme suffisamment de médicament pour avoir des effets nocifs graves chez un enfant. Flacon de sécurité. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Réactions indésirables

Certaines personnes pourraient souffrir de constipation, de diarrhée ou de vomissements. Le noircissement temporaire des dents causé par le sirop de fer peut être réduit au minimum par un brossage minutieux.

Surdosage ou ingestion accidentels

En cas de surdosage accidentel, avertissez immédiatement le médecin, un centre antipoison ou le service des urgences d'un hôpital.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1269779- 59 mL
20 kcal/30 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+®

Préparation initiale courante à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons nés à terme et en santé.

Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3) et deux fibres alimentaires (galacto-oligosaccharides et polydextrose).

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	68/280
Protéines (g)	1,35
% du total des calories	8
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé	
Glucides (g)	7,6
% du total des calories	44
Galacto-oligosaccharides (g)	0,2
Polydextrose (g)	0,2
Source : Lactose, galacto-oligosaccharides, polydextrose	
Matières grasses (g)	3,6
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,54
Acide linolénique (g)	0,051
ARA (mg)	23
ADH (mg)	11,5
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	53 1,32
Phosphore (mg) (mmol)	29 0,94
Magnésium (mg) (mmol)	5,4 0,22
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,68
Manganèse (mg)	0,0101
Cuivre (mg)	0,051
Iode (mg)	0,0101
Sélénium (mg)	0,00189
Sodium (mg) (mmol)	18,2 0,79
Potassium (mg) (mmol)	73 1,87
Chlorure (mg) (mmol)	43 1,2

Analyse	par 100 mL
Vitamines	
Vitamine A (UI)	200
Vitamine D (UI)	41
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,0061
Vitamine C (mg)	8,1
Thiamine (mg)	0,054
Riboflavine (mg)	0,095
Niacine (mg)	0,68
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,041
Acide folique (mg)	0,0108
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	4,1
Carnitine (mg)	1,35
Taurine (mg)	4,1
Nucléotides (mg)	2,8

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	12,5
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	270
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1210915 - 59 mL
24 kcal/30 mL
0,81 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+®
hypercalorique

Préparation hypercalorique à base de lait de vache conçue pour les nourrissons ayant d'importants besoins en énergie ou chez lesquels il faut restreindre l'apport liquidien. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	81/340
Protéines (g)	1,7
% du total des calories	8,5
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé	
Glucides (g)	8,8
% du total des calories	43,5
Source : Lactose	
Matières grasses (g)	4,3
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,65
Acide linolénique (g)	0,065
ARA (mg)	28
ADH (mg)	13,8
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	63 1,58
Phosphore (mg) (mmol)	35 1,13
Magnésium (mg) (mmol)	6,5 0,27
Fer (mg)	1,46
Zinc (mg)	0,81
Manganèse (mg)	0,0122
Cuivre (mg)	0,061
Iode (mg)	0,0122
Sélénium (mg)	0,0023
Sodium (mg) (mmol)	22 0,95
Potassium (mg) (mmol)	88 2,2
Chlorure (mg) (mmol)	51 1,44

Analyse	par 100 mL
Vitamines	
Vitamine A (UI)	240
Vitamine D (UI)	49
Vitamine E (UI)	1,62
Vitamine K (mg)	0,0073
Vitamine C (mg)	9,7
Thiamine (mg)	0,065
Riboflavine (mg)	0,114
Niacine (mg)	0,81
Acide pantothénique (mg)	0,41
Vitamine B_6 (mg)	0,049
Acide folique (mg)	0,013
Vitamine B_{12} (mg)	0,00024
Biotine (mg)	0,0024
Choline (mg)	19,5
Inositol (mg)	4,9
Carnitine (mg)	1,62
Taurine (mg)	4,9
Nucléotides (mg)	3,4

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	15,4
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	360
Osmolarité (mOsm/L)	320
Eau (g/100 mL)	88

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1215250 - 59 mL
Ⓤ Ingrédients parèves; installations laitières utilisées

Eau Enfamil®

Eau pour voie orale seulement

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

» Mode d'emploi

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1216351 - 59 mL
0,17 kcal/mL
Ⓤ Ingrédients parèves; installations laitières utilisées

Eau Glucosée à 5% Enfamil®

Eau glucosée à 5 %. Pour voie orale seulement.

Valeur nutritive	Par biberon nursette (59 mL)
Calories	10
Lipides	0 g
Glucides	3 g
Sucres	3 g
Protéines	0 g
Source : négligeable de sodium, de fibres, de vitamines A et C, de calcium et de fer.	

» Mode d'emploi

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Solution orale Enfamil® Enfalyte^MC
pour le maintien de l'équilibre électrolytique

N° d'article
2021478 - 177 mL
0,0126 kcal/mL
Ⓤ Ingredients parèves; installations laitières utilisées

Solution orale pour le maintien de l'équilibre électrolytique. Léger arôme de cerise.

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	12,6/53
Protéines (g)	0
Glucides (g)	3,2
% du total des calories	100
Source : Extraits secs de sirop de maïs (94%), citrates (6%)	
Matières grasses (g)	0
Électrolytes	
Sodium (mg) (mmol)	115 5
Potassium (mg) (mmol)	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	160 4,5
Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	12
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	170
Osmolarité (mOsm/L)	167
Teneur en eau (g/100 mL)	98

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1173080
0,71 g/sachet Ⓤ D

Fortifiant de lait maternel

Enfamil®

Supplément de lait maternel en poudre pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Quatre (4) sachets de fortifiant de lait maternel Enfamil®, soit la quantité habituellement ajoutée à 100 mL de lait maternel pour prématurés, offre l'apport suivant :

Analyse	par 4 sachets
Calories (kcal/kJ)	14/59
Protéines (g)	1,1
% du total des calories	32
Source : Isolats de protéines laitières, isolats de protéines de lactosérum hydrolysées	
Glucides (g)	< 0,4
% du total des calories	6
Source : Minéraux, extraits secs de sirop de maïs, citrates, lactose	
Matières grasses (g)	1
% du total des calories	62
Source : Huile TCM (70 %), huile de soya (30 %)	
Acide linoléique (mg)	140
Acide linolénique (mg)	17
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	90 2,3
Phosphore (mg) (mmol)	50 1,61
Magnésium (mg) (mmol)	1 0,04
Fer (mg)	1,44
Zinc (mg)	0,72
Manganèse (µg)	10
Cuivre (µg)	44
Sodium (mg) (mmol)	16 0,7
Potassium (mg) (mmol)	29 0,74

Analyse	par 4 sachets
Chlorure (mg) (mmol)	13 0,37
Vitamines	
Vitamine A (UI)	950
Vitamine D (UI)	150
Vitamine E (UI)	4,6
Vitamine K (mg)	0,0044
Vitamine C (mg)	12
Thiamine (mg)	0,15
Riboflavine (mg)	0,22
Niacine (mg)	3
Acide pantothénique (mg)	0,73
Vitamine B6 (mg)	0,115
Acide folique (mg)	0,025
Vitamine B_{12} (mg)	0,00018
Biotine (mg)	0,0027

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/4 sachets)[1]	9,8*
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	+ 35†
Osmolarité (mOsm/L)	Non disponible

» Mode d'emploi

* Lorsqu'il est ajouté au lait maternel pour prématurés selon les recommandations (4 sachets/100 mL), le fortifiant de lait maternel Enfamil® augmente la charge osmotique rénale possible d'environ 9,8 mOsm/4 sachets.
† Lorsqu'il est ajouté au lait maternel pour prématurés selon les recommandations (4 sachets/100 mL), le fortifiant de lait maternel Enfamil® augmente l'osmolalité d'envrion 35 mOsm/kg d'eau.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1250748 - 59 mL
20 kcal/30 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® pour prématurés

20 kcal

Préparation à base de lait de vache et à faible teneur en fer fournissant un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Énergie (kcal/kJ)	68/280	100/420
Protéines (g)	2	3
% du total des calories	12	12
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Gluicides (g)	7,4	11
% du total des calories	44	44
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matière grasses (g)	3,4	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,55	0,81
Acide linolénique (g)	0,061	0,09
ARA (mg)	23	34
ADH (mg)	11,5	17
Minéraux		
Calcium (mg) (mMol)	112 2,8	165 4,1
Phosphore (mg) (mMol)	56 1,81	83 2,7
Magnésium (mg) (mMol)	6,1 0,25	9 0,37
Fer (mg)	0,34	0,5
Zinc (mg)	1,01	1,5
Manganèse (mg)	0,0043	0,0063
Cuivre (mg)	0,081	0,12
Iode (mg)	0,0169	0,025
Sodium (mg) (mMol)	39 1,71	58 2,5
Potassium (mg) (mMol)	66 1,7	98 2,5
Chlorure (mg) (mMol)	61 1,71	90 2,5

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Vitamines		
Vitamine A (IU)	850	1250
Vitamine D (IU)	162	240
Vitamine E (IU)	4,3	6,3
Vitamine K (mg)	0,0054	0,008
Vitamine C (mg)	13,5	20
Thiamine (mg)	0,135	0,2
Riboflavine (mg)	0,2	0,3
Niacine (mg)	2,7	4
Acide pantothénique (mg)	0,81	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,101	0,15
Acide folique (mg)	0,027	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,00017	0,00025
Biotine (mg)	0,0027	0,004
Choline (mg)	13,5	20
Inositol (mg)	30	44
Carnitine (mg)	1,62	2,4
Taurine (mg)	4,1	6
Nucléotides (mg)	2,8	4,2

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	18,4
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	240
Osmolarité (mOsm/L)	220
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy, *J Pediatr.* 1999;134:11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1250747 - 59 mL
20 kcal/30 mL
0,68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® avec fer pour prématurés
20 kcal

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Énergie (kcal/kJ)	68/280	100/420
Protéines (g)	2	3
% du total des calories	12	12
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Gluicides (g)	7,4	11
% du total des calories	44	44
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matière grasses (g)	3,4	5,1
% du total des calories	44	44
Source :Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,55	0,81
Acide linolénique (g)	0,061	0,09
ARA (mg)	23	34
ADH (mg)	11,5	17
Minéraux		
Calcium (mg) (mMol)	112 2,8	165 4,1
Phosphore (mg) (mMol)	56 1,81	83 2,7
Magnésium (mg) (mMol)	6,1 0,25	9 0,37
Fer (mg)	1,22	1,8
Zinc (mg)	1,01	1,5
Manganèse (mg)	0,0043	0,0063
Cuivre (mg)	0,081	0,12
Iode (mg)	0,0169	0,025
Sodium (mg) (mMol)	39 1,71	58 2,5
Potassium (mg) (mMol)	66 1,7	98 2,5
Chlorure (mg) (mMol)	61 1,71	90 2,5

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Vitamines		
Vitamine A (IU)	850	1250
Vitamine D (IU)	162	240
Vitamine E (IU)	4,3	6,3
Vitamine K (mg)	0,0054	0,008
Vitamine C (mg)	13,5	20
Thiamine (mg)	0,135	0,2
Riboflavine (mg)	0,2	0,3
Niacine (mg)	2,7	4
Acide pantothénique (mg)	0,81	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,101	0,15
Acide folique (mg)	0,027	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,00017	0,00025
Biotine (mg)	0,0027	0,004
Choline (mg)	13,5	20
Inositol (mg)	30	44
Carnitine (mg)	1,62	2,4
Taurine (mg)	4,1	6
Nucléotides (mg)	2,8	4,2

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	18,4
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	240
Osmolarité (mOsm/L)	220
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1215246 - 59 mL
24 kcal/30 mL
0,81 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® pour prématurés
24 kcal

Préparation à base de lait de vache et à faible teneur en fer fournissant un apport accru en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Calories (kcal/kJ)	81/340	100/420
Protéines (g)	2,4	3
% du total des calories	12	12
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	8,9	11
% du total des calories	44	44
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	4,1	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,66	0,81
Acide linolénique (g)	0,073	0,09
ARA (mg)	28	34
ADH (mg)	13,8	17
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	134 3,3	165 4,1
Phosphore (mg) (mmol)	67 2,2	83 2,7
Magnésium (mg) (mmol)	7,3 0,3	9 0,37
Fer (mg)	0,41	0,5
Zinc (mg)	1,22	1,5
Manganèse (mg)	0,0051	0,0063
Cuivre (mg)	0,097	0,12
Iode (mg)	0,02	0,025
Sodium (mg) (mmol)	47 2,0	58 2,5
Potassium (mg) (mmol)	80 2,0	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	73 2,1	90 2,5

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Vitamines		
Vitamine A (UI)	1010	1250
Vitamine D (UI)	195	240
Vitamine E (UI)	5,1	6,3
Vitamine K (mg)	0,0065	0,008
Vitamine C (mg)	16,2	20
Thiamine (mg)	0,162	0,2
Riboflavine (mg)	0,24	0,3
Niacine (mg)	3,2	4
Acide pantothénique (mg)	0,97	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,122	0,15
Acide folique (mg)	0,032	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00025
Biotine (mg)	0,0032	0,004
Choline (mg)	16,2	20
Inositol (mg)	36	44
Carnitine (mg)	1,95	2,4
Taurine (mg)	4,9	6
Nucléotides (mg)	3,4	4,2

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	22
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	260
Eau (g/100 mL)	88

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1281250 - 59 mL
24 kcal/30 mL
0,81 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® pour prématurés hyper protéinée
24 kcal

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer spécialement conçue pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui ont besoin d'un apport accru en protéines. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3). Pour utilisation en établissement seulement.

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Calories (kcal/kJ)	81/340	100/420
Protéines (g)	2,8	3,5
% du total des calories	14	14
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	8,5	10,5
% du total des calories	42	42
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	4,1	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,66	0,81
Acide linolénique (g)	0,073	0,09
ARA (mg)	28	34
ADH (mg)	13,8	17
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	134 3,3	165 4,1
Phosphore (mg) (mmol)	67 2,2	83 2,7
Magnésium (mg) (mmol)	7,3 0,3	9 0,37
Fer (mg)	1,46	1,8
Zinc (mg)	1,22	1,5
Manganèse (mg)	0,0051	0,0063
Cuivre (mg)	0,097	0,12
Iode (mg)	0,02	0,025
Sodium (mg) (mmol)	47 2,0	58 2,5
Potassium (mg) (mmol)	80 2,0	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	73 2,1	90 2,5

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Vitamines		
Vitamine A (UI)	1020	1250
Vitamine D (UI)	195	240
Vitamine E (UI)	5,1	6,3
Vitamine K (mg)	0,0073	0,009
Vitamine C (mg)	16,2	20
Thiamine (mg)	0,162	0,2
Riboflavine (mg)	0,24	0,3
Niacine (mg)	3,2	4
Acide pantothénique (mg)	0,97	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,122	0,15
Acide folique (mg)	0,032	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00025
Biotine (mg)	0,0032	0,004
Choline (mg)	16,2	20
Inositol (mg)	36	44
Carnitine (mg)	1,95	2,4
Taurine (mg)	4,9	6
Nucléotides (mg)	3,4	4,2

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	24
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	260
Eau (g/100 mL)	88

» Mode d'emploi

Utiliser sous surveillance médicale. Voir l'avis sur l'emballage. L'apport en protéines ne doit pas dépasser 4,0 à 4,5 g/kg/j chez les nourrissons de 1000 g ou moins (3,6-4,1 g/100 kcal) et 3,5 à 4,0 g/kg/j chez les nourrissons de 1000 à 1800 g (3,2-3,6 g/100 kcal). Ce produit pourrait contenir jusqu'à 3,85 g de protéines/100 kcal. Produit non destiné à l'alimentation des nourrissons prématurés après l'atteinte d'un poids approximatif de 3600 g, sauf avis contraire d'un médecin.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Guide des produits

À l'intention des professionnels de la santé

N° d'article
1215248 - 59 mL
24 kcal/30 mL
0,81 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® avec fer pour prématurés
24 kcal

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer fournissant un apport accru en énergie, en protéines, en vitamines et en minéraux pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Calories (kcal/kJ)	81/340	100/420
Protéines (g)	2,4	3
% du total des calories	12	12
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	8,9	11
% du total des calories	44	44
Source : Extraits secs de sirop de maïs, lactose		
Matières grasses (g)	4,1	5,1
% du total des calories	44	44
Source : Huile TCM (40 %), huile de soya (30 %), huile de tournesol ou de carthame à forte teneur en acide oléique (27 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,66	0,81
Acide linolénique (g)	0,073	0,09
ARA (mg)	28	34
ADH (mg)	13,8	17
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	134 3,3	165 4,1
Phosphore (mg) (mmol)	67 2,2	83 2,7
Magnésium (mg) (mmol)	7,3 0,3	9 0,37
Fer (mg)	1,46	1,8
Zinc (mg)	1,22	1,5
Manganèse (mg)	0,0051	0,0063
Cuivre (mg)	0,097	0,12
Iode (mg)	0,02	0,025
Sodium (mg) (mmol)	47 2,0	58 2,5
Potassium (mg) (mmol)	80 2,0	98 2,5
Chlorure (mg) (mmol)	73 2,1	90 2,5

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Vitamines		
Vitamine A (UI)	1010	1250
Vitamine D (UI)	195	240
Vitamine E (UI)	5,1	6,3
Vitamine K (mg)	0,0065	0,008
Vitamine C (mg)	16,2	20
Thiamine (mg)	0,162	0,2
Riboflavine (mg)	0,24	0,3
Niacine (mg)	3,2	4
Acide pantothénique (mg)	0,97	1,2
Vitamine B_6 (mg)	0,122	0,15
Acide folique (mg)	0,032	0,04
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002	0,00025
Biotine (mg)	0,0032	0,004
Choline (mg)	16,2	20
Inositol (mg)	36	44
Carnitine (mg)	1,95	2,4
Taurine (mg)	4,9	6
Nucléotides (mg)	3,4	4,2

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	22
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	300
Osmolarité (mOsm/L)	260
Eau (g/100 mL)	88

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1215387 - 59 mL
22kcal/ 30 mL
0.74 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil® A+® EnfaCare®

Préparation à base de lait de vache et enrichie de fer pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui sortent de l'hôpital. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Calories (kcal/kJ)	74/310	100/420
Protéines (g)	2,1	2,8
% du total des calories	11	11
Source : Concentré de protéines de lactosérum, lait écrémé		
Glucides (g)	7,7	10,4
% du total des calories	42	42
Source : Maltodextrine, lactose		
Matières grasses (g)	3,9	5,3
% du total des calories	47	47
Source : Huile végétale à forte teneur en acide oléique (34 %), huile de soya (29 %), huile TCM (20 %), huile de noix de coco (14 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (3 %)		
Acide linoléique (g)	0,67	0,9
Acide linolénique (g)	0,067	0,09
ARA (mg)	25	34
ADH (mg)	12,6	17
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	120 3,0
Phosphore (mg) (mmol)	49 1,58	66 2,1
Magnésium (mg) (mmol)	5,9 0,24	8 0,33
Fer (mg)	1,33	1,8
Zinc (mg)	0,92	1,25
Manganèse (mg)	0,0111	0,015
Cuivre (mg)	0,089	0,12
Iode (mg)	0,0155	0,021
Sélénium (mg)	0,0021	0,0028
Sodium (mg) (mmol)	26 1,13	35 1,52
Potassium (mg) (mmol)	78 2,0	105 2,7
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,63	78 2,2

Analyse	par 100 mL	par 100 kcal
Vitamines		
Vitamine A (UI)	330	450
Vitamine D (UI)	52	70
Vitamine E (UI)	3	4
Vitamine K (mg)	0,0059	0,008
Vitamine C (mg)	11,8	16
Thiamine (mg)	0,148	0,2
Riboflavine (mg)	0,148	0,2
Niacine (mg)	1,48	2
Acide pantothénique (mg)	0,63	0,85
Vitamine B_6 (mg)	0,074	0,1
Acide folique (mg)	0,0192	0,026
Vitamine B_{12} (mg)	0,00022	0,0003
Biotine (mg)	0,0044	0,006
Choline (mg)	17,8	24
Inositol (mg)	22	30
Carnitine (mg)	1,48	2
Taurine (mg)	4,4	6
Nucléotides (mg)	3,1	4,2

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	18,3
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	250
Osmolarité (mOsm/L)	220
Eau (g/100 mL)	89

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1271623 - 59 mL
20 kcal/30 mL
0.68 kcal/mL Ⓤ D

Enfamil A+® Sans Lactose

Préparation à base de lait de vache, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons sensibles au lactose. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3). Non destinée aux nourrissons ou aux enfants atteints de galactosémie.

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	68/280
Protéines (g)	1,42
% du total des calories	8,5
Source : Isolats de protéines laitières	
Glucides (g)	7,4
% du total des calories	43,5
Source : Extraits secs de sirop de maïs	
Matières grasses (g)	3,6
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,54
Acide linolénique (g)	0,051
ARA (mg)	23
ADH (mg)	11,5
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	55 1,38
Phosphore (mg) (mmol)	31 1,0
Magnésium (mg) (mmol)	5,4 0,22
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,68
Manganèse (mg)	0,0101
Cuivre (mg)	0,051
Iode (mg)	0,0101
Sélénium (mg)	0,00189
Sodium (mg) (mmol)	20 0,88
Potassium (mg) (mmol)	74 1,9
Chlorure (mg) (mmol)	45 1,28

Analyse	par 100 mL
Vitamines	
Vitamine A (UI)	200
Vitamine D (UI)	41
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,0061
Vitamine C (mg)	8,1
Thiamine (mg)	0,054
Riboflavine (mg)	0,095
Niacine (mg)	0,68
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,041
Acide folique (mg)	0,0108
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	4,1
Taurine (mg)	4,1
Nucléotides (mg)	2,8

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale (mOsm/100 mL)[1]	13,2
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	200
Osmolarité (mOsm/L)	182
Eau (g/100 mL)	91

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1271716 - 59 mL
20 kcal/30 mL
0,68 kcal/mL
Ⓤ Ingrédients parèves; installations laitières utilisées

Enfamil A+® Soya

Préparation à base de soya, enrichie de fer et sans lactose conçue pour les nourrissons qui ont besoin d'une préparation sans lait pour des raisons sanitaires ou culturelles. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	**68/280**
Protéines (g)	**1,69**
% du total des calories	10
Source : Isolats de protéines de soya (avec ajout de L-méthionine)	
Glucides (g)	7,2
% du total des calories	42
Source : Extraits secs de sirop de maïs	
Matières grasses (g)	3,6
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,58
Acide linolénique (g)	0,054
ARA (mg)	23
ADH (mg)	11.5
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	71 1,77
Phosphore (mg) (mmol)	47 1,51
Magnésium (mg) (mmol)	5,4 0,22
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,81
Manganèse (mg)	0,0169
Cuivre (mg)	0,051
Iode (mg)	0,0101
Sélénium (mg)	0,00189
Sodium (mg) (mmol)	24 1,06

Analyse	par 100 mL
Potassium (mg) (mmol)	81 2,1
Chlorure (mg) (mmol)	54 1,52
Vitamines	
Vitamine A (UI)	200
Vitamine D (UI)	41
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,0061
Vitamine C (mg)	8,1
Thiamine (mg)	0,054
Riboflavine (mg)	0,061
Niacine (mg)	0,68
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,041
Acide folique (mg)	0,0108
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	4,1
Carnitine (mg)	1,35
Taurine (mg)	4,1

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	15,8
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	200
Osmolarité (mOsm/L)	180
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1272691 - 59 mL
20 kcal/30 mL
0.68 kcal/mL Non casher

Nutramigen® A+®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons présentant une allergie aux protéines du lait de vache, notamment des bébés aux prises avec des coliques*. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	68/280
Protéines (g)	1,89
% du total des calories	11
Source : Hydrolysat de caséine, mélange d'acides aminés	
Glucides (g)	7
% du total des calories	41
Source : Sirop de maïs, amidon de maïs modifié	
Matières grasses (g)	3,6
% du total des calories	48
Source : Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,58
Acide linolénique (g)	0,054
ARA (mg)	23
ADH (mg)	11.5
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	64 1,59
Phosphore (mg) (mmol)	35 1,13
Magnésium (mg) (mmol)	5,4 0,22
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,68
Manganèse (mg)	0,0169
Cuivre (mg)	0,051
Iode (mg)	0,0101
Sélénium (mg)	0,00189
Sodium (mg) (mmol)	32 1,38

Analyse	par 100 mL
Potassium (mg) (mmol)	74 1,9
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,64
Vitamines	
Vitamine A (UI)	200
Vitamine D (UI)	34
Vitamine E (UI)	1,35
Vitamine K (mg)	0,0061
Vitamine C (mg)	8,1
Thiamine (mg)	0,054
Riboflavine (mg)	0,061
Niacine (mg)	0,68
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,041
Acide folique (mg)	0,0108
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	11,5
Carnitine (mg)	1,35
Taurine (mg)	4,1

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	320
Osmolarité (mOsm/L)	290
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

* Attribuables à une allergie aux protéines du lait de vache

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1273987 - 59 mL
20 kcal/30 mL
0.68 kcal/mL Non casher

Pregestimil® A+®

Préparation hypoallergénique fortement hydrolysée et enrichie de fer pour la prise en charge alimentaire des nourrissons atteints d'un trouble de malabsorption des graisses ou pouvant être sensibles aux protéines entières. Contient de l'ADH (un type d'acide gras oméga 3).

Analyse	par 100 mL
Calories (kcal/kJ)	68/280
Protéines (g)	1,89
% du total des calories	11
Source : Caséine hydrolysée, mélange d'acides aminés	
Glucides (g)	6,9
% du total des calories	41
Source : Sirop de maïs, amidon de maïs modifié	
Matières grasses (g)	3,8
% du total des calories	48
Source : Huile TCM (55 %), huile de soya (35 %), huile de carthame riche en acide oléique (7,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)	
Acide linoléique (g)	0,64
Acide linolénique (g)	0,081
ARA (mg)	23
ADH (mg)	11,5
Minéraux	
Calcium (mg) (mmol)	64 1,59
Phosphore (mg) (mmol)	35 1,13
Magnésium (mg) (mmol)	5,4 0,22
Fer (mg)	1,22
Zinc (mg)	0,68
Manganèse (mg)	0,0169
Cuivre (mg)	0,051
Iode (mg)	0,0101
Sélénium (mg)	0,00189
Sodium (mg) (mmol)	32 1,38
Potassium (mg) (mmol)	74 1,9
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,64

Analyse	par 100 mL
Vitamines	
Vitamine A (UI)	240
Vitamine D (UI)	34
Vitamine E (UI)	2,7
Vitamine K (mg)	0,0081
Vitamine C (mg)	8,1
Thiamine (mg)	0,054
Riboflavine (mg)	0,061
Niacine (mg)	0,68
Acide pantothénique (mg)	0,34
Vitamine B_6 (mg)	0,041
Acide folique (mg)	0,0108
Vitamine B_{12} (mg)	0,0002
Biotine (mg)	0,002
Choline (mg)	16,2
Inositol (mg)	11,5
Carnitine (mg)	1,35
Taurine (mg)	4,1

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	16,9
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	290
Osmolarité (mOsm/L)	260
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134: 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
2001922 - préparation en poudre, 454 g
0,68 kcal/mL

Phenyl-Free® 1

Préparation sans phénylalanine, enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie (PCU).

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	2,2	16,2
% du total des calories	13	13
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	3,5	26
% du total des calories	47	47
Source: Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,046	0,34
ARA (mg)	24	175
ADH (mg)	11,9	88
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	660 16,5
Phosphore (mg) (mmol)	59 1,92	440 14,2
Magnésium (mg) (mmol)	8,9 0,37	66 2,7
Fer (mg)	1,3	9,6
Zinc (mg)	1,16	8,6
Manganèse (mg)	0,051	0,38
Cuivre (mg)	0,116	0,86
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,0019	0,0141
Sodium (mg) (mmol)	32 1,41	240 10,4

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Minéraux		
Potassium (mg) (mmol)	76 1,93	560 14,3
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,64	430 12,1
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	51	380
Vitamine E (UI)	1,35	10
Vitamine K (mg)	0,0054	0,044
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,135	1
Riboflavine (mg)	0,135	1
Niacine (mg)	1,35	10
Acide pantothénique (mg)	0,51	3,8
Vitamine B_6 (mg)	0,135	1
Acide folique (mg)	0,0135	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,00027	0,002
Biotine (mg)	0,0051	0,038
Choline (mg)	16,7	124
Inositol (mg)	11,6	86
Carnitine (mg)	6,9	51
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	19,5
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	350
Osmolarité (mOsm/L)*	320
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment de phénylalanine en consommant aussi d'autres aliments qui contiennent cet acide aminé en fonction des besoins. Les préparations en poudre ne sont pas stériles.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1281335 - préparation en poudre, 454 g
0,85 kcal/mL

Phenyl-Free® 2

Préparation en poudre sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	410/1720
Protéines (g)	4,6	22
% du total des calories	22	22
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	12,4	60
% du total des calories	59	59
Source: Sucre, extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,78	8,6
% du total des calories	19	19
Source: Huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,87	4,2
Acide linolénique (g)	0,108	0,52
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	151 3,8	730 18,2
Phosphore (mg) (mmol)	151 4,9	730 24
Magnésium (mg) (mmol)	34 1,39	163 6,7
Fer (mg)	2,5	12,2
Zinc (mg)	2,5	12,2
Manganèse (mg)	0,27	1,31
Cuivre (mg)	0,25	1,22
Iode (mg)	0,013	0,063
Sélénium (mg)	0,006	0,029
Sodium (mg) (mmol)	126 5,5	610 27
Potassium (mg) (mmol)	230 5,8	1100 28
Chlorure (mg) (mmol)	178 5	860 24

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	300	1430
Vitamine D (UI)	60	290
Vitamine E (UI)	2	9,8
Vitamine K (mg)	0,0085	0,041
Vitamine C (mg)	10,1	49
Thiamine (mg)	0,25	1,22
Riboflavine (mg)	0,2	0,98
Niacine (mg)	4,6	22
Acide pantothénique (mg)	1,01	4,9
Vitamine B_6 (mg)	0,2	0,98
Acide folique (mg)	0,072	0,35
Vitamine B_{12} (mg)	0,0005	0,0024
Biotine (mg)	0,0101	0,049
Choline (mg)	20	98
Inositol (mg)	10,1	49
Carnitine (mg)	10,1	49
Taurine (mg)	10,1	49

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	47
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	920
Osmolarité (mOsm/L)*	790
Eau (g/100 mL)	86

» Mode d'emploi

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas de phénylalanine, un acide aminé essentiel.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999;134:11-14.
* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1281334 - préparation en poudre, 454 g
0,85 kcal/mL

Phenyl-Free® 2 HP

Préparation en poudre riche en protéines et sans phénylalanine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de phénylcétonurie.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	390/1630
Protéines (g)	8,6	40
% du total des calories	41	41
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	9,5	44
% du total des calories	44	44
Source: Sucre, extraits secs de sirop de maïs, mélange d'acides aminés, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,36	6,3
% du total des calories	15	15
Source: Huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,65	3
Acide linolénique (g)	0,082	0,38
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	210 5,3	980 24
Phosphore (mg) (mmol)	210 6,8	980 32
Magnésium (mg) (mmol)	63 2,6	290 11,9
Fer (mg)	3,4	15,7
Zinc (mg)	3,4	15,7
Manganèse (mg)	0,34	1,57
Cuivre (mg)	0,34	1,57
Iode (mg)	0,0108	0,05
Sélénium (mg)	0,0078	0,036
Sodium (mg) (mmol)	89 3,9	410 17,8
Potassium (mg) (mmol)	250 6,5	1180 30
Chlorure (mg) (mmol)	210 6	980 28

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	420	1960
Vitamine D (UI)	84	390
Vitamine E (UI)	2,5	11,8
Vitamine K (mg)	0,011	0,051
Vitamine C (mg)	13,6	63
Thiamine (mg)	0,34	1,57
Riboflavine (mg)	0,28	1,29
Niacine (mg)	6,3	29
Acide pantothénique (mg)	1,36	6,3
Vitamine B_6 (mg)	0,28	1,29
Acide folique (mg)	0,102	0,47
Vitamine B_{12} (mg)	0,00067	0,0031
Biotine (mg)	0,0136	0,063
Choline (mg)	14,5	67
Inositol (mg)	13,6	63
Carnitine (mg)	7,8	36
Taurine (mg)	13,6	63

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	72
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	1240
Osmolarité (mOsm/L)*	1070
Eau (g/100 mL)	86

» Mode d'emploi

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas de phénylalanine, un acide aminé essentiel.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999;134:11-14.

* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
2001957 - préparation en poudre, 454 g
0,68 kcal/mL

TYROS 1

Préparation sans tyrosine ni phénylalanineet enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de tyrosinémie de type I et de type II.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	2,3	16,7
% du total des calories	13	13
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	3,5	26
% du total des calories	47	47
Source: Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,046	0,34
ARA (mg)	24	175
ADH (mg)	11,9	88
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	660 16,5
Phosphore (mg) (mmol)	59 1,92	440 14,2
Magnésium (mg) (mmol)	8,9 0,37	66 2,7
Fer (mg)	1,3	9,6
Zinc (mg)	1,16	8,6
Manganèse (mg)	0,051	0,38
Cuivre (mg)	0,116	0,86
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,0019	0,0141
Sodium (mg) (mmol)	32 1,41	240 10,4

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Minéraux		
Potassium (mg) (mmol)	82 2,1	610 15,6
Chlorure (mg) (mmol)	58 1,64	430 12,1
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	51	380
Vitamine E (UI)	1,35	10
Vitamine K (mg)	0,0054	0,044
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,135	1
Riboflavine (mg)	0,135	1
Niacine (mg)	1,35	10
Acide pantothénique (mg)	0,51	3,8
Vitamine B_6 (mg)	0,135	1
Acide folique (mg)	0,0135	0,1
Vitamine B_{12} (mg)	0,00027	0,002
Biotine (mg)	0,0051	0,038
Choline (mg)	16,7	124
Inositol (mg)	11,6	86
Carnitine (mg)	6,8	50
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	20
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	360
Osmolarité (mOsm/L)*	320
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment de phénylalanine et de tyrosine en mangeant aussi des aliments qui en contiennent.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1281396 - préparation en poudre, 454 g
0.85 kcal/mL

TYROS 2

Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	410/1720
Équivalent protéique (g)	4,6	22
% du total des calories	22	22
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	12,5	60
% du total des calories	59	59
Source : Extraits secs de sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,77	8,5
% du total des calories	19	19
Source: huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,87	4,2
Acide linolénique (g)	0,108	0,52
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	152 3,8	730 18,2
Phosphore (mg) (mmol)	152 4,9	730 24
Magnésium (mg) (mmol)	34 1,4	163 6,7
Fer (mg)	2,5	12,2
Zinc (mg)	2,5	12,2
Manganèse (mg)	0,27	1,3
Cuivre (mg)	0,25	1,22
Iode (mg)	0,0131	0,063
Sélénium (mg)	0,0058	0,028
Sodium (mg) (mmol)	127 5,5	610 27
Potassium (mg) (mmol)	230 5,9	1100 28
Chlorure (mg) (mmol)	177 5,0	850 24

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	300	1420
Vitamine D (UI)	58	280
Vitamine E (UI)	2	9,8
Vitamine K (mg)	0,0085	0,041
Vitamine C (mg)	10,2	49
Thiamine (mg)	0,25	1,22
Riboflavine (mg)	0,2	0,98
Niacine (mg)	4,6	22
Acide pantothénique (mg)	1,02	4,9
Vitamine B_6 (mg)	0,2	0,98
Acide folique (mg)	0,073	0,35
Vitamine B_{12} (mg)	0,0005	0,0024
Biotine (mg)	0,0102	0,049
Choline (mg)	20	98
Inositol (mg)	10,2	49
Carnitine (mg)	10,2	49
Taurine (mg)	10,2	49

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	48
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	830
Osmolarité (mOsm/L)*	710
Eau (g/100 mL)	86

» Mode d'emploi

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas de tyrosine ni de phénylalanine, des acides aminés essentiels.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr. 1999;134:11-14.

* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
2001952- préparation en poudre, 454 g
0,68 kcal/mL

BCAD 1

Préparation sans isoleucine, leucine ni valine et enrichie de fer avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	68/280	500/2090
Équivalent protéique (g)	2,2	16,2
% du total des calories	13	13
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	6,9	51
% du total des calories	40	40
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	3,5	26
% du total des calories	47	47
Source: Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,54	4
Acide linolénique (g)	0,046	0,34
ARA (mg)	24	175
ADH (mg)	11,9	88
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	89 2,2	660 16,5
Phosphore (mg) (mmol)	59 1,92	440 14,2
Magnésium (mg) (mmol)	8,9 0,37	66 2,7
Fer (mg)	1,3	9,6
Zinc (mg)	1,16	8,6
Manganèse (mg)	0,051	0,38
Cuivre (mg)	0,116	0,86
Iode (mg)	0,0103	0,076
Sélénium (mg)	0,0019	0,0141
Sodium (mg) (mmol)	32 1,41	240 10,4

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Minéraux		
Potassium (mg) (mmol)	81 2,1	600 15,3
Chlorure (mg) (mmol)	68 1,9	500 14,1
Vitamines		
Vitamine A (UI)	210	1520
Vitamine D (UI)	51	380
Vitamine E (UI)	1,35	10
Vitamine K (mg)	0,0054	0,044
Vitamine C (mg)	8,1	60
Thiamine (mg)	0,135	1
Riboflavine (mg)	0,135	1
Niacine (mg)	1,35	10
Acide pantothénique (mg)	0,51	3,8
Vitamine B_6 (mg)	0,135	1
Acide folique (mg)	0,0135	0,1
Vitamine B_{12} (µg)	0,00027	0,002
Biotine (mg)	0,0051	0,038
Choline (mg)	16,7	124
Inositol (mg)	11,6	86
Carnitine (mg)	6,8	50
Taurine (mg)	4,1	30

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	20
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	330
Osmolarité (mOsm/L)*	300
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment d'isoleucine, de leucine et de valine en mangeant aussi des aliments qui contiennent de ces acides aminés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,68 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1281386 - préparation en poudre, 454 g
0.85 kcal/mL

BCAD 2

Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou d'autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	410/1720
Équivalent protéique, g	5	24
% du total des calories	24	24
Source: Mélange d'acides aminés		
Glucides (g)	11,9	57
% du total des calories	57	57
Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié		
Matières grasses (g)	1,77	8,5
% du total des calories	19	19
Source: huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,87	4,2
Acide linolénique (g)	0,108	0,52
Minéraux		
Calcium (mg) (mMol)	152 3,8	730 18,2
Phosphore (mg) (mmol)	152 4,9	730 24
Magnésium (mg) (mmol)	34 1,39	163 6,7
Fer (mg)	2,5	12,2
Zinc (mg)	2,5	12,2
Manganèse (mg)	0,27	1,3
Cuivre (mg)	0,25	1,22
Iode (mg)	0,0131	0,063
Sélénium (mg)	0,0058	0,028
Sodium (mg) (mmol)	127 5,5	610 27
Potassium (mg) (mmol)	250 6,5	1220 31
Chlorure (mg) (mmol)	210 6	1020 29

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	360	1730
Vitamine D (UI)	73	350
Vitamine E (UI)	2,4	11,4
Vitamine K (mg)	0,0098	0,047
Vitamine C (mg)	11,9	57
Thiamine (mg)	0,3	1,42
Riboflavine (mg)	0,24	1,14
Niacine (mg)	5,4	26
Acide pantothénique (mg)	1,19	5,7
Vitamine B_6 (mg)	0,24	1,14
Acide folique (mg)	0,085	0,41
Vitamine B_{12} (mg)	0,00058	0,0028
Biotine (mg)	0,0119	0,057
Choline (mg)	20	98
Inositol (mg)	11,9	57
Carnitine (mg)	10,2	49
Taurine (mg)	11,9	57

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	51
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)*	900
Osmolarité (mOsm/L)*	780
Eau (g/100 mL)	86

» Mode d'emploi

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Les protéines sont incomplètes du fait qu'elles ne contiennent pas d'isoleucine, de leucine ni de valine, des acides aminés essentiels.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

* Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
2001927 - préparation en poudre, 454 g
0,69 kcal/mL



PFD 1

Préparation sans protéines ni acides aminés* enrichie de vitamines, de minéraux et d'acides gras essentiels avec de l'ADH et de l'ARA destinée aux nourrissons et aux jeunes enfants qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés

* Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n'est pas un constituant des protéines.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	69/290	530/2220
Protéines (g)	0	0
% du total des calories	0	0
Source: Non disponible		
Glucides (g)	7,8	60
% du total des calories	46	46
Source: Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, sucre		
Matières grasses (g)	4,2	32
% du total des calories	54	54
Source: Oléine d'huile de palme (44 %), huile de soya (19,5 %), huile de noix de coco (19,5 %), huile de tournesol riche en acide oléique (14,5 %), ARA et ADH provenant d'un mélange d'huile d'organismes unicellulaires (2,5 %)		
Acide linoléique (g)	0,64	4,9
Acide linolénique (g)	0,052	0,4
ARA (mg)	25	190
ADH (mg)	12,4	95
Minéraux		
Calcium (mg) (mmol)	103 2,6	790 20
Phosphore (mg) (mmol)	69 2,2	530 17,1
Magnésium (mg) (mmol)	10,3 0,42	79 3,3
Fer (mg)	1,37	10,5
Zinc (mg)	1,37	10,5
Manganèse (mg)	0,061	0,47
Cuivre (mg)	0,137	1,05
Iode (mg)	0,0117	0,09
Sélénium (mg)	0,0021	0,0158
Sodium (mg) (mmol)	36 1,58	280 12,2
Potassium (mg) (mmol)	90 2,3	690 17,6
Chlorure (mg) (mmol)	69 1,94	530 14,9

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	240	1840
Vitamine D (UI)	59	450
Vitamine E (UI)	1,72	13,2
Vitamine K (mg)	0,0069	0,053
Vitamine C (mg)	9,6	74
Thiamine (mg)	0,172	1,32
Riboflavine (mg)	0,157	1,21
Niacine (mg)	1,57	12,1
Acide pantothénique (mg)	0,6	4,6
Vitamine B_6 (mg)	0,157	1,21
Acide folique (mg)	0,0172	0,132
Vitamine B_{12} (mg)	0,00034	0,0026
Biotine (mg)	0,0061	0,047
Choline (mg)	17,6	135
Inositol (mg)	14,2	109
Carnitine (mg)	8,2	63
Taurine (mg)	4,8	37

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	8
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)†	171
Osmolarité (mOsm/L)†	154
Eau (g/100 mL)	90

» Mode d'emploi

Tous les produits destinés aux personnes atteintes de troubles métaboliques doivent être utilisés sous la supervision directe et constante d'un médecin ou d'un diététiste spécialisé en troubles métaboliques.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de prendre suffisamment de protéines ou d'acides aminés en mangeant aussi des aliments qui contiennent des protéines.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy.J Pediatr. 1999; 134 : 11-14.

† Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,69 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1281389 - préparation en poudre, 454 g
0.85 kcal/mL

PFD 2

Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés* destinée à l'alimentation des enfants et des adultes (3 ans et plus) chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés.

*Ce produit renferme de la taurine, un acide aminé qui n'est pas un constituant des protéines.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	85/360	400/1670
Equivalent protéique, g	0	0
% du total des calories	0	0
Source: Non disponible		
Glucides (g)	18,7	88
% du total des calories	89	89
Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre, fécule de maïs modifiée		
Matières grasses (g)	1,02	4,8
% du total des calories	11	11
Source: huile de soya		
Acide linoléique (g)	0,49	2,3
Acide linolénique (g)	0,06	0,28
Minéraux		
Calcium (mg) (mMol)	85 2,1	400 10
Phosphore (mg) (mmol)	85 2,7	400 12,9
Magnésium (mg) (mmol)	19,4 0,8	91 3,7
Fer (mg)	1,34	6,3
Zinc (mg)	1,34	6,3
Manganèse (mg)	0,147	0,69
Cuivre (mg)	0,134	0,63
Iode (mg)	0,0075	0,035
Sélénium (mg)	0,003	0,0142
Sodium (mg) (mmol)	77 3,3	360 15,7
Potassium (mg) (mmol)	72 1,85	340 8,7
Chlorure (mg) (mmol)	68 1,92	320 9,0

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	168	790
Vitamine D (UI)	33	154
Vitamine E (UI)	1,09	5,1
Vitamine K (mg)	0,0047	0,022
Vitamine C (mg)	5,5	26
Thiamine (mg)	0,134	0,63
Riboflavine (mg)	0,109	0,51
Niacine (mg)	2,4	11,5
Acide pantothénique (mg)	0,55	2,6
Vitamine B_6 (mg)	0,109	0,51
Acide folique (mg)	0,038	0,178
Vitamine B_{12} (mg)	0,00025	0,00119
Biotine (mg)	0,0055	0,026
Choline (mg)	10,9	51
Inositol (mg)	5,5	26
Carnitine (mg)	5,5	26
Taurine (mg)	5,5	26

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	9,8
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)†	450
Osmolarité (mOsm/L)†	380
Eau (g/100 mL)	86

» Mode d'emploi

Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.

Les aliments fonctionnels en poudre ne sont pas stériles.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel du fait qu'il ne contient pas de protéines ni d'acides aminés.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

† Les valeurs pour 100 mL et les renseignements sur les autres caractéristiques sont fondés sur le mélange du produit avec de l'eau pour obtenir une densité calorique de 0,85 kcal/mL.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article
1175249 - préparation en poudre, 454 g
1,01 kcal/mL ⓊD

PORTAGEN
A MILK PROTEIN-BASED POWDER MADE WITH MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES FOR ADULTS AND CHILDREN
1 LB (454 g)
MeadJohnson

Portagen®

Préparation à base de protéines de lait avec triglycérides à chaîne moyenne (TCM) destinée aux enfants et aux adultes.

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Calories (kcal/kJ)	101/420	470/1970
Protéines (g)	3,7	17
% du total des calories	14	14
Source: Caséinate de sodium		
Glucides (g)	11,6	54
% du total des calories	46	46
Source: Extraits secs de sirop de maïs, sucre		
Matières grasses (g)	4,7	22
% du total des calories	40	40
Source: Huile TCM (87 %), huile de maïs (13 %)		
Acide linoléique (g)	0,28	1,3
Minéraux		
Calcium (mg)	95	440
Phosphore (mg)	71	330
Magnésium (mg)	21	96
Fer (mg)	1,89	8,8
Zinc (mg)	0,95	4,4
Manganèse (mg)	0,127	0,59
Cuivre (mg)	0,159	0,74
Iode (mg)	0,0071	0,033
Sélénium (mg)	–	–
Sodium (mg)	52	240
Potassium (mg)	127	590
Chlorure (mg)	86	400

Analyse	par 100 mL	par 100 g
Vitamines		
Vitamine A (UI)	340	1560
Vitamine D (UI)	28	130
Vitamine E (UI)	1,59	7,4
Vitamine K (mg)	0,008	0,037
Vitamine C (mg)	3,9	18
Thiamine (mg)	0,08	0,37
Riboflavine (mg)	0,095	0,44
Niacine (mg)	1,05	4,9
Acide pantothénique (mg)	0,54	2,5
Vitamine B_6 (mg)	0,105	0,49
Acide folique (mg)	0,0101	0,047
Vitamine B_{12} (mg)	0,00032	0,0015
Biotine (mg)	0,0039	0,018
Choline (mg)	1,35	63
Inositol (mg)	nd	nd
Carnitine (mg)	2,9	13,3
Taurine (mg)	–	–

Autres Caractéristiques	
Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 mL)[1]	31
Osmolalité (mOsm/kg H_2O)	350
Osmolarité (mOsm/L)	300
Eau (g/100 mL)	87

– = n'en contient pas
nd=non indiquée

» Mode d'emploi

Portagen® devrait être utilisé seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste.

Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. S'il doit être utilisé à long terme, il faudrait envisager la prise de suppléments d'acides gras essentiels et de minéraux en ultratraces.

1. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. *J Pediatr.* 1999; 134 : 11-14.

Les valeurs nutritives peuvent changer. Consultez les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Tétines Enfamil® et sucettes

Les tétines Enfamil sont conçues pour être utilisées avec les biberons Nursette®. Il existe cinq tétines différentes pour satisfaire les diverses préférences des nourrissons, des parents et des professionnels de la santé. Elles sont toutes prêtes à l'emploi et jetables. Chaque caisse contient 240 tétines. Les tétines Enfamil sont faites de plastique chirurgical et sont exemptes de latex. Les tétines et sucettes NUK®, quant à elles, contiennent du latex.

Tétine Enfamil® Souple à Débit Standard
N° d'article 1208370 - 240 par caisse
Tétine souple à débit standard et à orifice unique (0,014 po) conçue pour les préparations courantes.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

Tétine Enfamil® Souple à Débit Lent
N° d'article 1208371 - 240 par caisse
Tétine souple à débit lent et à orifice unique (0,014 po) conçue pour les situations où un débit plus lent est souhaité. Généralement utilisée par les nourrissons prématurés ou par ceux qui ont des besoins particuliers.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

Tétine Enfamil® à Orifice Cruciforme
N° d'article 1015664 - 240 par caisse
Tétine à orifice cruciforme (5/32 x 5/32 x 1/64 po) à débit plus rapide conçue pour les situations d'alimentation où un orifice plus grand ou un débit plus rapide sont nécessaires.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

Tétine Enfamil® Pour Nouveau-né
N° d'article 1015655 - 240 par caisse
Tétine à orifice unique (0,018 po) plus courte et plus petite que nos autres tétines, conçue pour les nourrissons qui ont besoin d'une tétine plus petite. Généralement utilisée par les nourrissons prématurés ou par ceux qui ont des besoins particuliers.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Plastique chirurgical (TPE)	N	N	N	N

Tétine Orthodontique pour Nouveau-né NUK®*
N° d'article 1015473 - 240 par caisse
Sa forme est conçue pour ressembler au mamelon de la mère durant l'allaitement. Cette tétine **contient** du latex.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Caoutchouc latex	O	N	N	N

Sucette Orthodontique pour Nouveau-né NUK®*
N° d'article 1015474 - 100 par caisse
Destinée aux nourrissons de moins de 4 mois. Cette sucette **contient** du latex.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène (partie en plastique) Caoutchouc latex (tétine)	O	N	N	N

Information exacte en date du november 2012

NUK est une marque déposée de MAPA, Allemagne.
DEHP signifie phtalate de bis(2-éthylexyle) ou phtalate de dioctyle

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Biberons

Mead Johnson distribue des biberons en plastique, des contenants Grad-U-Feed®, Snappies® pour la conservation du lait maternel et des biberons pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine. Tous ces biberons sont prêts à l'emploi et jetables. Ils sont tous exempts de latex et de BPA.

Biberons en plastique prêts à l'emploi
N° d'article 1014765 - 48 par caisse
Biberon en plastique pratique pouvant contenir 240 mL (8 oz liq.) vendu avec une tétine Enfamil® souple à débit standard, une bague de tétine et un couvercle de tétine. Le biberon est fait de polypropylène et est exempt de latex.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Contenants Grad-U-Feed®
N° d'article 1014815 - 100 par caisse
Les contenants Grad-U-Feed® peuvent contenir 60 mL (2 oz liq.) et sont utilisés pour l'alimentation des nourrissons qui nécessitent une quantité inférieure à 60 mL dans les unités néonatales de soins intensifs. Le contenant Grad-U-Feed n'est pas conçu pour la conservation du lait maternel. Les tétines ne sont pas offertes avec les contenants Grad-U-Feed®. Les tétines Enfamil peuvent être utilisées. Chaque caisse contient 100 contenants Grad-U-Feed®.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Contenant Snappies® pour la conservation du lait maternel
N° d'article 1233036 - 200 par caisse
Les contenants Snappies® sont des contenants de 70 mL (2,3 oz liq.) conçus pour recueillir, conserver et donner le lait maternel exprimé. Les contenants Snappies® sont conçus en un seul morceau. Le couvercle à charnière pratique est fixé au contenant Snappies® afin qu'il soit possible de l'ouvrir et de le fermer d'une seule main. Les biberons sont aseptiques et prêts à l'emploi. Les biberons peuvent supporter des températures de congélation aussi basses que -57 °C (-70 °F).

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Bouchons Grad-U-Feed®
N° d'article 1053582 - 750 par caisse
Ces bouchons en plastique blancs sont conçus pour être utilisés sur les contenants Grad-U-Feed®. Ils doivent être stérilisés avant usage et sont conçus pour être utilisés une seule fois. Chaque caisse contient 750 bouchons.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polypropylène	N	N	N	N

Biberon pour Nourrissons Présentant une Fissure Labio-Palatine
N° d'article 1015466 - 72 par caisse
Le biberon pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine est un biberon pressable qui peut contenir 180 mL (6 oz liq.). Il est offert avec une tétine allongée conçue pour les nourrissons présentant une fissure labiopalatine. Chaque caisse contient 72 biberons pour nourrissons présentant une fissure labiopalatine. La tétine est faite de plastique chirurgical et est exempte de latex.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polyéthylène	N	N	N	N

Biberon pour Nourrissons Présentant une Fissure Labio-Palatine
N° d'article 1015466 - 72 par caisse
Le biberon pour nourrissons présentant une fissure labio-palatine est un biberon pressable qui peut contenir 180 mL (6 oz liq.). Il est offert avec une tétine allongée conçue pour les nourrissons présentant une fissure labiopalatine. Chaque caisse contient 72 biberons pour nourrissons présentant une fissure labiopalatine. La tétine est faite de plastique chirurgical et est exempte de latex.

Composition du produit	Latex O/N	BPA O/N	PVC O/N	Phtalates (ou DEHP) O/N
Polyéthylène	N	N	N	N

Information exacte en date du november 2012

DEHP signifie phtalate de bis(2-éthylexyle) ou phtalate de dioctyle

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Instructions destinées au milieu hospitalier

pour bien preparer, conserver et utiliser les preparations pour nourrissons

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour réduire le plus possible les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation[1]. »

Instructions concernant la préparation et l'utilisation[1,2]

- Suivre rigoureusement la procédure de l'hôpital
- S'assurer qu'il s'agit du produit prescrit (s'assurer d'avoir le bon produit et en confirmer la dilution)
- Lavez et séchez vos mains. Nettoyez soigneusement la surface de travail avec une solution désinfectante antibactérienne qui convient aux surfaces entrant en contact avec des aliments.
- S'assurer que le contenant n'est pas endommagé
- Utiliser seulement des contenants et des instruments de mesure stérilisés
- Éviter la contamination par contact à chaque étape de la préparation
- Inspecter visuellement la préparation (si une quelconque anomalie est détectée, mettre la préparation de côté et contacter le
- représentant Mead Johnson)
- Utiliser de préférence une eau stérilisée froide pour reconstituer les préparations sous forme de liquide concentré ou de poudre
- Ne pas utiliser un mélangeur pour reconstituer les préparations en poudre
- Ne pas conserver dans un chauffe-biberon ni utiliser de four à micro-ondes pour réchauffer la préparation

Instructions concernant la conservation des préparations apprêtées

Recommandations

Réfrigération

- Conserver de préférence dans des réfrigérateurs réservés à cet usage
- Conserver entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures

Température ambiante

- La préparation doit être offerte immédiatement ou utilisée dans les 2 heures suivant sa reconstitution.
- Si la préparation a été réchauffée, la jeter après une heure

Après le début de la tétée

- Ne pas conserver pendant plus de une heure
- Ne pas réfrigérer pour utilisation ultérieure

Durée d administration de l alimentation par sonde*† en fonction du type de préparation	Nouveaux-nés ou nourrissons/ enfants immunodéprimés	Nourrissons et enfants ayant un système immunitaire sain
Préparation prête à employer (commercialement stérile)	4 h	8 h
Préparations liquides concentrées (commercialement stériles) Préparations en poudre (non stériles)	4 h	4 h
Poudre ajoutée à une préparation liquide ou au lait maternel3	4 h	4 h
Liquide (commercialement stérile) ajouté au lait maternel	4 h	4 h

L'absence de conformité à ces instructions pourrait entraîner de graves conséquences pour les nourrissons.

* D'après Robbins et Meyers, p.100[2].
† Pour les directives sur les changements de réservoir et de sonde, consulter la publication de l'American Dietetic Association, Guidelines for Preparation of Formula and Breastmilk in Health Care Facilities. American Dietetic Association, 2004.

1. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals.* Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4. 2. Robbins ST, Meyers R, eds. Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities. Chicago, Ill: American Dietetic Association; 2011. 3. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, et al. Fortifying fresh human milk with commercial powdered human milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. *J Am Diet Assoc.* 2005;105:1567-1572.

L'American Dietetic Association a été renommée Academy of Nutrition and Dietetics

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Fortifiant de lait maternel Enfamil®

Directives de préparation

Le fortifiant de lait maternel Enfamil® est un supplément nutritif servant à enrichir le lait maternel humain destiné aux nourrissons prématurés.

MISE EN GARDE : Suivre attentivement les instructions suivantes, car la santé du bébé en dépend. Utiliser seulement selon les directives d'un professionnel de la santé. Une mauvaise hygiène, une technique de préparation inadéquate, une dilution erronée, une utilisation inappropriée ou de mauvaises conditions de conservation peuvent entraîner des conséquences graves. Même si cette préparation en poudre est destinée à l'alimentation des nourrissons prématurés, les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons ou à des nourrissons prématurés immunodéprimés, sauf en cas de prescription ou sous la surveillance d'un médecin.

- Des instructions quant au nombre de calories à ajouter seront fournies par le médecin du bébé.
- Suivre le protocole de l'hôpital ou les instructions du médecin pour la manipulation sécuritaire du lait maternel.
- Pour faciliter le mélange, bien agiter le lait maternel. Verser la quantité désirée dans un récipient stérile et chauffer jusqu'à l'atteinte de la température adéquate pour alimenter le nourrisson.
- Ajouter le fortifiant en poudre au lait maternel conformément au tableau suivant :

Calories supplémentaires désirées	Lait maternel	Fortifiant de lait maternel Enfamil®
2 kcal/30 mL	50 mL	1 sachet
4 kcal/30 mL	25 mL	1 sachet

- **L'absence de conformité à ces instructions pourrait entraîner de graves conséquences pour les nourrissons. Une fois préparé, le lait maternel fortifié peut se gâter rapidement.**
- Servir ou couvrir immédiatement le lait maternel fortifié et le conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Agiter avant de servir.
- **Alimentation par sonde** : Une fois préparé, le lait maternel fortifié ne doit pas demeurer à la température ambiante pendant plus de 4 heures[1]. Cette consigne s'appuie sur une recommandation de l'Academy of Nutrition and Dietetics (anciennement l'American Dietetic Association) selon laquelle le lait maternel fortifié ne devrait pas demeurer à la température ambiante (25 °C/77 °F) pendant plus de 4 heures[2].
- **Alimentation au biberon** : Verser uniquement la quantité nécessaire de lait maternel fortifié dans un biberon et servir immédiatement. Ne pas utiliser le lait maternel fortifié s'il est demeuré plus de 2 heures à la température ambiante. Une fois entamé, le biberon ne doit pas être réfrigéré. Donner la portion de lait maternel fortifié pendant l'heure qui suit, sinon la jeter.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

Pendant l'utilisation de ce produit :

1. Mesurer régulièrement les taux sériques de calcium, de sodium, d'azote uréique, d'albumine, etc. En cas d'élévation du taux sérique de l'un de ces éléments, réduire la quantité de fortifiant de lait maternel Enfamil ajoutée au lait maternel. En cas de carence, un supplément pourrait être indiqué.
2. Ne pas administrer d'autres suppléments que le fortifiant de lait maternel Enfamil, à moins que des analyses appropriées ne commandent l'administration d'un supplément donné.
3. Ne pas ajouter plus d'un sachet de fortifiant de lait maternel Enfamil par 25 mL de lait maternel.
4. Le lait maternel prélevé au cours des 2 semaines suivant un accouchement prématuré est particulièrement riche en éléments nutritifs. L'ajout de fortifiant de lait maternel Enfamil n'est donc généralement pas nécessaire.

Si l'alimentation du bébé inclut plus de 25 sachets par jour, il faut surveiller les signes liés à un apport excessif en vitamines A et D.

CONSERVATION : Conserver le fortifiant de lait maternel Enfamil® en poudre à la température ambiante. Protéger du gel et de la chaleur excessive.

Utiliser avant la date apparaissant sur l'emballage.

Ni le lait maternel ni les préparations en poudre ne sont stériles.

AVERTISSEMENT : Nourrissons de poids extrêmement faible (1 kg ou moins) : On a signalé des cas d'hypercalcémie chez certains de ces nourrissons recevant uniquement du lait maternel fortifié par voie entérale.

1. Telang S, Berseth CL, Ferguson PW, et al. Fortifying fresh human milk with commercial powdered human milk fortifiers does not affect bacterial growth during 6 hours at room temperature. *J Am Diet Assoc.* 2005;105:1567-1572. 2. Robbins ST, Meyers R, eds. Infant Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities. Chicago, Ill: American Dietetic Association; 2011.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Produits de Mead Johnson Nutrition

Format des boîtes et quantitiés obtenues

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de vie
Préparation pour nourrissons				
Enfamil A+®	Pdr	663 g	4900 mL (21 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
	Pdr	992 g	7400 mL (31 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
	Conc.	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz)	12 Mois
	PAS	237 mL	237 mL (1 bouteille x 8 oz)	15 Mois
Enfamil® Faible en Fer	Pdr	900 g	6800 mL (29 bouteilles x 8 oz)	36 Mois
	Conc.	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz)	15 Mois
Enfamil®	Pdr	900 g	6900 mL (29 bouteilles x 8 oz)	36 Mois
	Conc.	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz)	15 Mois
Enfamil® 2	Pdr	900 g	6800 mL (29 bouteilles x 8 oz)	36 Mois
	Conc.	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz)	15 Mois
Enfamil A+® **2**	Pdr	550 g	4000 mL (17 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
	Pdr	992 g	7300 mL (31 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
	Conc.	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz)	12 Mois
Enfamil A+® Épaissie	Pdr	660 g	5000 mL (21 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
Enfamil A+ Gentlease®	Pdr	629 g	4700 mL (20 bouteilles x 8 oz)	21 Mois
	Pdr	942 g	7100 mL (30 bouteilles x 8 oz)	21 Mois
Enfamil A+® Sans Lactose	Pdr	730 g	5500 mL (23 bouteillles x 8oz)	18 Mois
	Conc.	385 mL	770 mL (3 bouteilles x 8 oz)	12 Mois
Enfamil A+® Soya	Pdr	730 g	5500 mL (23 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
Nutramigen® A+®	Pdr	454 g	3300 mL (14 bouteilles x 8 oz)	18 Mois
	PAS	945 mL	945 mL (4 bouteilles x 8 oz)	12 Mois
PURAMINO™ A+®	Pdr	400 g	2900 mL (12 bouteilles x 8 oz)	15 Mois
Pregestimil® A+®	Pdr	454 g	3400 mL (14 bouteilles x 8 oz)	21 Mois
Enfamil® A+® EnfaCare®	Pdr	363 g	2400 mL (13,5 bouteilles x 6 oz)	18 Mois

Produit	Format	Unité	Quantité approximative de produit apprêtée obtenue à la dilution normale	Durée de vie
Supplement Nutritionnel				
Enfagrow® A+® vanille	Pdr	680 g	19 x 200mL	12 Mois
Enfagrow® A+® saveur de lait	Pdr	680 g	19 x 200 mL	12 Mois
Produits métaboliques				
Phenyl-Free® 1	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 Mois
Phenyl-Free® 2	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 Mois
Phenyl-Free® 2 HP	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 Mois
TYROS 1	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 Mois
TYROS 2	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 Mois
BCAD 1	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 Mois
BCAD 2	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 Mois
PFD 1	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	18 Mois
PFD 2	Pdr	454 g	La quantité obtenue ne s'applique pas aux produits métaboliques	24 Mois
Produit pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux				
Portagen®	Pdr	454 g	2,1 L @ 30 kcal/30 mL	24 Mois
Vitamines				
Enfamil® D-Vi-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	18 Mois
Enfamil® Tri-Vi-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	15 Mois
Enfamil® Poly-Vi-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	15 Mois
Enfamil® Fer-In-Sol®	Liquide	50 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	24 Mois
Enfamil® Fer-In-Sol®	Sirop	250 mL	La quantité obtenue ne s'applique pas aux vitamines	24 Mois

Consulter les étiquettes des produits pour obtenir les plus récents renseignements.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition en acides aminés des préparations pour nourrissons

Acides aminés essentiels

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine	Cysteine	Phénylalanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
Enfamil A+® mg/100 kcal mg/100g*	50 250	116 590	210 1080	180 910	46 230	36 184	84 420	80 400	122 620	35 177	122 620
Enfamil A+ Gentlease® mg/100 kcal mg/100g	58 290	133 680	250 1250	210 1050	53 270	42 210	97 490	92 470	140 710	40 200	140 710
Enfamil A+® Épaissie mg/100 kcal mg/100g	73 360	130 640	250 1250	210 1040	63 310	23 112	125 620	125 620	115 570	35 175	158 780
Enfamil® A+® EnfaCare® mg/100 kcal mg/100g*	70 350	162 800	300 1480	250 1240	64 320	51 250	118 580	112 550	171 840	49 240	171 840
Enfamil A+® Soya mg/100 kcal mg/100g*	68 340	123 620	210 1040	158 800	65 330	28 140	133 670	98 500	93 470	33 165	128 650
Pregestimil® A+® mg/100 kcal mg/100g*	84 420	162 810	270 1370	240 1180	73 360	48 240	137 690	59 290	129 640	46 230	200 1010
Nutramigen® A+® mg/100 kcal mg/100g*	84 420	162 810	270 1360	240 1170	73 360	48 240	137 680	59 290	129 640	46 230	200 1000
PURAMINO™ A+® mg/100 kcal mg/100g	73 360	190 950	340 1710	220 1110	64 320	73 360	140 700	151 750	171 850	67 330	210 1060
Enfamil A+® Sans Lactose mg/100 kcal mg/100g*	61 310	109 560	210 1090	176 910	53 270	18,9 97	105 540	105 540	97 500	30 152	132 680
Enfamil A+® 2 mg/100 kcal mg/100g*	75 370	135 670	260 1300	220 1080	65 320	23 116	130 650	130 650	120 590	37 182	164 810
Enfagrow® A+® mg/100 kcal mg/100g	116 520	210 930	400 1800	340 1500	100 450	36 160	200 890	200 890	184 820	56 250	250 1120

* En poudre seulement.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition en acides aminés des préparations pour nourrissons

Acides aminés non essentiels

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique	Glycine	Proline	Sérine
Enfamil A+® mg/100 kcal mg/100g*	 60 300	 88 440	 200 990	 400 2000	 40 200	 160 810	 114 580
Enfamil A+ Gentlease® mg/100 kcal mg/100g	 69 350	 101 510	 230 1150	 460 2300	 46 230	 184 940	 131 670
Enfamil A+® Épaissie mg/100 kcal mg/100g	 88 430	 85 420	 200 990	 550 2700	 50 250	 250 1230	 145 720
Enfamil® A+® EnfaCare® mg/100 kcal mg/100g*	 84 410	 123 610	 270 1350	 560 2800	 56 280	 220 1100	 160 790
Enfamil A+® Soya mg/100 kcal mg/100g*	 200 1020	 108 550	 290 1490	 470 2400	 105 530	 135 690	 128 650
Pregestimil® A+® mg/100 kcal mg/100g*	 112 560	 95 480	 210 1060	 640 3200	 59 290	 290 1470	 162 810
Nutramigen® A+® mg/100 kcal mg/100g*	 112 560	 95 470	 210 1060	 640 3200	 59 290	 290 1460	 162 810
PURAMINO™ A+® mg/100 kcal mg/100g	 148 740	 270 1350	 560 2800	 168 830	 73 360	 280 1390	 171 850
Enfamil A+® Sans Lactose† mg/100 kcal mg/100g*	 74 380	 71 370	 168 860	 460 2400	 42 220	 210 1070	 116 590
Enfamil A+® 2 mg/100 kcal mg/100g*	 91 450	 88 440	 210 1030	 570 2800	 52 260	 260 1280	 151 750
Enfagrow® A+® mg/100 kcal mg/100g*	 140 620	 136 610	 320 1420	 880 3900	 80 360	 400 1760	 230 1030

*En poudre seulement
† Les valeurs de la préparation concentrée varient légèrement.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition en acides aminés des préparations pour troubles du métabolisme

Acides aminés essentiels

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine	Cysteine	Phénylalanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
BCAD 1 mg/100 kcal mg/100g	109 550	0 0	0 0	350 1770	93 470	67 340	182 920	182 920	150 760	80 410	0 0
BCAD 2 mg/100 kcal mg/100g	220 890	0 0	0 0	700 2900	189 770	136 550	370 1490	370 1490	300 1220	159 650	0 0
PFD[MC] 1 mg/100 kcal mg/100g	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
PFD[MC] 2 mg/100 kcal mg/100g	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Phenyl-Free® 1 mg/100 kcal mg/100g	80 410	230 1150	420 2100	260 1300	70 360	48 240	0 0	320 1600	147 750	58 290	250 1250
Phenyl-Free® 2 mg/100 kcal mg/100g	135 550	380 1560	700 2900	430 1760	119 480	81 330	0 0	530 2200	250 1010	97 400	420 1690
Phenyl-Free® 2 HP mg/100 kcal mg/100g	260 1000	720 2800	1330 5200	820 3200	220 880	153 600	0 0	1010 4000	470 1840	184 720	790 3100
Tyros[MC] 1 mg/100 kcal mg/100g	83 420	240 1200	440 2200	270 1370	73 370	53 270	0 0	0 0	155 780	63 320	260 1320
Tyros[MC] 2 mg/100 kcal mg/100g	135 550	390 1580	710 2900	440 1800	119 480	86 350	0 0	0 0	250 1030	103 420	430 1740

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition en acides aminés des préparations pour troubles du métabolisme

Acides aminés non essentiels

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique	Glycine	Proline	Sérine
BCAD 1 mg/100 kcal mg/100g	 230 1180	 250 1280	 310 1560	 610 3100	 141 710	 310 1560	 154 780
BCAD 2 mg/100 kcal mg/100g	 420 1730	 460 1870	 550 2300	 1100 4500	 250 1030	 550 2300	 280 1130
PFD[MC] 1 mg/100 kcal mg/100g	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
PFD[MC] 2 mg/100 kcal mg/100g	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
Phenyl-Free® 1 mg/100 kcal mg/100g	 192 970	 210 1070	 250 1280	 510 2600	 115 580	 250 1280	 125 630
Phenyl-Free® 2 mg/100 kcal mg/100g	 320 1320	 360 1450	 430 1740	 850 3500	 194 790	 430 1740	 210 860
Phenyl-Free® 2 HP mg/100 kcal mg/100g	 610 2400	 670 2600	 810 3200	 1610 6300	 370 1440	 810 3200	 400 1560
Tyros[MC] 1 mg/100 kcal mg/100g	 220 1100	 240 1200	 290 1450	 570 2900	 129 650	 290 1450	 142 720
Tyros[MC] 2 mg/100 kcal mg/100g	 360 1450	 390 1580	 470 1910	 930 3800	 210 860	 470 1910	 230 950

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition en acides aminés pour la préparation Portagen

Acides aminés essentiels

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine	Cysteine	Phénylalanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
mg/100 kcal	104	184	350	290	101	15.5	191	210	158	56	240
mg/100 mL	490	870	1630	1380	480	73	900	990	750	270	1120

Composition en acides aminés pour la préparation Portagen

Acides aminés non essentiels

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique	Glycine	Proline	Sérine
mg/100 kcal	133	115	260	830	68	390	210
mg/100 mL	630	540	1240	3900	320	1850	1000

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Composition en acides aminés pour les préparations pour nourrissons prématurés

Acides aminés essentiels

Produit	Histidine	Isoleucine	Leucine	Lysine	Méthionine	Cysteine	Phénylalanine	Tyrosine	Thréonine	Tryptophane	Valine
Enfamil® Premature A+® 20 kcal Low Iron and with Iron (59 mL)											
mg/100 kcal	75	174	320	270	69	55	126	120	183	53	183
mg/100 mL	50	116	210	180	46	36	84	80	122	35	122
Enfamil® Premature A+® 24 kcal Low Iron and with Iron (59 mL)											
mg/100 kcal	75	174	320	270	69	55	126	120	183	53	183
mg/100 mL	60	139	260	220	55	44	101	96	146	42	146
Enfamil® Premature A+® 24 kcal High Protein (59 mL)											
mg/100 kcal	88	200	370	320	81	64	147	140	210	61	210
mg/100 mL	70	162	300	250	64	51	118	112	171	49	171
Enfamil® Human Milk Fortifier Powder											
mg/100 kcal	200	470	870	730	186	147	340	320	490	142	490
mg/100g	1000	2300	4300	3600	920	730	1680	1600	2400	700	2400
Enfamil® A+® Enfacare® (59 mL)											
mg/100 kcal	70	162	300	250	64	51	118	112	171	49	171
mg/100 mL	53	122	220	189	48	38	88	84	128	37	128

Composition en acides aminés pour les préparations pour nourrissons prématurés

Acides aminés non essentiels

Produit	Arginine	Alanine	Acide aspartique	Acide glutamique	Glycine	Proline	Sérine
Enfamil® Premature A+® 20 Low Iron and with Iron(59 mL)							
mg/100 kcal	90	132	290	600	60	240	171
mg/100 mL	60	88	200	400	40	160	114
Enfamil® Premature A+® 24 kcal Low Iron and with Iron (59 mL)							
mg/100 kcal	90	132	290	600	60	240	171
mg/100 mL	72	106	240	480	48	192	137
Enfamil® Premature A+® 24 kcal High Protein (59 mL)							
mg/100 kcal	105	154	340	700	70	280	200
mg/100 mL	84	123	270	560	56	220	160
Enfamil® Human Milk Fortifier Powder							
mg/100 kcal	240	360	790	1620	162	650	460
mg/100g	1200	1760	3900	8000	800	3200	2300
Enfamil® A+® Enfacare® (59 mL)							
mg/100 kcal	84	123	270	560	56	220	160
mg/100 mL	63	92	210	420	42	168	120

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Resneignements nutritionnels divers

Calculs et conversions

Apports nutritionnels de référence (ANREF) - Conversion des unités

Acide folique	1 EFA = 1 µg d'acide folique de source alimentaire
Niacine	1 équivalent nutritionel = 1 mg de niacine 1 équivalent nutritionnel = 60 mg de Tryptophanee
Vitamine A	1 équivalent d'activité rétinol = 1 µg de rétinol = 3,33 UI de rétinol Pour la vitamine A préformée, 1 équivalent rétinol = 1 équivalent d'activité rétinol
Vitamine D	1 µg = 40 UI
Vitamine E	1 UI de vitamine E naturelle ou synthétique = 0,67 mg d'équivalent alpha-tocophérol 1 UI de vitamine E synthétique et esters = 0,45 mg d'alpha-tocophérol 1 UI de vitamine E naturelle et esters = 0,67 mg d'alpha-tocophérol

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Enfamil A+®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	58 (2,0)	65 (2,2)
22	0,74	52 (1,8)	59 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	54 (1,8)
26	0,88	43 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	48 (1,6)
28	0,95	40 (1,3)	46 (1,6)
30	1,01	37 (1,2)	43 (1,5)

† Enfamil A+® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	65 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	59 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	54 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	48 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil® Plus Faible en Fer doivent être préparées à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure d'Enfamil® Plus Faible en Fer fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Enfamil®

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	65 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	59 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	54 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	48 (1,6)
28	0,95	41 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil® doivent être préparées à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure d'Enfamil® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil® A+® EnfaCare®

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq,) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq,)
par oz liq.‡	par mL		
22	0,74	57 (1,9)	65 (2,2)
24	0,81	52 (1,7)	59 (2,0)
26	0,88	47 (1,6)	55 (1,8)
27	0,91	45 (1,5)	53 (1,8)
28	0,95	43 (1,5)	51 (1,7)
30	1,01	40 (1,3)	47 (1,6)

† Enfamil® A+® EnfaCare® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil® A+® EnfaCare® fournit 48 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,3 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Enfamil A+® 2

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	67 (2,3)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	48 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil A+® 2 doivent être préparées à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® 2 fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil® 2

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	43 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	38 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil® 2 doivent être préparées des mesures rases, **non tassées.**
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil® 2 fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 6 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Enfamil A+ Gentlease®

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil A+ Gentlease® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+ Gentlease® fournit 44 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil A+® Épaissie

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,9)

† Enfamil A+® Épaissie doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® Épaissie fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Enfamil A+® Sans Lactose

Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,8)
26	0,88	44 (1,5)	50 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil A+® Sans Lactose doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près.

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer ensuite le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® Sans Lactose fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Enfamil A+® Soya

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,6)
28	0,95	41 (1,4)	47 (1,7)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Enfamil A+® Soya doivent être préparées à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Enfamil A+® Soya fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Nutramigen® A+®

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	60 (2,0)	67 (2,3)
22	0,74	54 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	49 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,7)
28	0,95	41 (1,4)	48 (1,6)
30	1,01	37 (1,3)	44 (1,5)

† Nutramigen® A+® doivent être préparées à partir des mesures rases, **tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Nutramigen A+ fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

PURAMINO™ A+®
Pour 1 mesure

kcal désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	30 (1,0)	33 (1,1)
22	0,74	27 (0,9)	30 (1,0)
24	0,81	24 (0,8)	28 (0,9)
26	0,88	22 (0,7)	26 (0,9)
27	0,91	21 (0,7)	25 (0,8)
28	0,95	20 (0,7)	24 (0,8)
30	1,01	19 (0,6)	22 (0,8)

† PURAMINO™ A+® doit être préparée à partir des mesures rases, **non tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre PURAMINO™ A+® fournit 22 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 3 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations en poudre pour nourrisons

Remarque : Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.

Ces dilutions conviennent aux préparations en poudre de Mead Johnson suivantes :

Pregestimil® A+®

Pour 1 mesure

kcal Désirées		Ajouter 1 mesure de poudre† au volume d'eau en mL (oz liq.) indiqué	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.‡	par mL		
20	0,68	59 (2,0)	66 (2,2)
22	0,74	53 (1,8)	60 (2,0)
24	0,81	48 (1,6)	55 (1,9)
26	0,88	44 (1,5)	51 (1,7)
27	0,91	42 (1,4)	49 (1,6)
28	0,95	40 (1,4)	47 (1,6)
30	1,01	37 (1,2)	44 (1,5)

† Pregestimil® A+® doivent être préparées à partir des mesures rases, **tassées**.
‡ Les mesures en onces liquides du tableau ci-dessus sont arrondies au dixième le plus près

Il est plus facile de mélanger la poudre si elle est versée **sur** l'eau. Fermer le biberon et agiter pendant environ 5 secondes. Le nombre de mesures et la quantité d'eau ajoutée peuvent être doublés ou triplés pour obtenir un plus grand volume.

Une mesure de poudre Pregestimil A+ fournit 45 kcal.
Une mesure de poudre déplace un volume d'eau d'environ 7 mL (0,2 oz liq.)
Une oz liq. américaine = 29,57 mL 1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Renseignements sur les mesures des produits en poudre de Mead Johnson Nutrition

Poudres	Poids d'une mesure (grammes)	kcal/mesure	Volume déplacé (mL/g de poudre)	kcal/g	Protéines (mg/100 g)
Enfamil A+®	8,8	44	0,76	5,1	10,6
Enfamil®	8,5	44	0,72	5,2	10,8
Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®	8,5	44	0,73	5,2	10,8
Enfamil A+® Sans Lactose	8,7	45	0,77	5,1	10,8
Enfamil A+® Soy	8,8	45	0,77	5,1	12,7
Nutramigen® A+®	9*	45	0,77	5,0	13,9
PURAMINO™ A+®	4,5	22	0,76	5,0	13,9†
Pregestimil® A+®	8,9*	45	0,78	5,0	14
Enfamil A+® Épaissie	8,9	44	0,76	5,0	12,4
Enfamil® A+® EnfaCare®	9,8	48	0,76	4,9	13,8
Enfamil A+ Gentlease®	8,7	44	0,77	5,1	11,7
Enfamil® 2	8,9	45	0,72	5,0	13
Enfamil A+® 2	9	45	0,77	5,0	12,9
Enfagrow® A+® vanille & saveur de lait	9	40	0,73	4,4	17,8
Phenyl-Free® 1	4,5	23	0,76	5,0	16,2†
Phenyl-Free® 2	14,4	59	0,67	4,1	22†
Phenyl-Free® 2 HP	15,1	59	0,67	3,9	40†
BCAD 1	4,5	23	0,77	5,0	16,2†
BCAD 2	14,5	59	0,67	4,1	24†
PFD 1	4,5	24	0,78	5,3	0
PFD 2	14,9	59	0,65	4,0	0
TYROS 1	4,5	23	0,77	5,0	16,7†
TYROS 2	14,5	59	0,67	4,1	22†
Portagen®	9,4*	44	0,75	4,7	17

* Mesure rase tassée - toutes les autres mesures sont rases non tassées

† Équivalents protéiques

Quand la précision est essentielle, peser en grammes. Prendre note que la taille des mesures varie selon les produits. Utiliser la mesure fournie avec le produit pour obtenir la densité calorique désirée.

Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles. « Pour réduire le plus possible les risques d'infection, les préparations en poudre ne sont pas recommandées chez les nourrissons prématurés ou immunodéprimés. Elles pourront néanmoins être utilisées si aucun autre produit nutritionnel ne peut être utilisé. Leur utilisation devra alors se faire sous étroite surveillance médicale, suivant des conditions strictes de préparation, de conservation et d'utilisation. »[1]

1. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals*. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Dilution des préparations pour nourrissons liquides concentrées

Ces dilutions conviennent aux préparations concentrées de Mead Johnson suivantes:

Enfamil A+®, Enfamil®, Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®, Enfamil A+® Sans Lactose, Enfamil A+® 2 et Enfamil® 2

kcal désirées		mL (oz liq.) d'eau à ajouter à une boîte de 385 mL de liquide concentré	Quantité de préparation obtenue, mL (oz liq.)
par oz liq.	par mL		
20	0,68	384 (13)	769 (26)
22	0,74	311 (10,5)	695 (23,5)
24	0,81	251 (8,5)	636 (21,5)
26	0,88	207 (7)	591 (20)
27	0,91	177 (6)	562 (19)
28	0,95	163 (5,5)	547 (18,5)
30	1,01	133 (4,5)	518 (17,5)

Chaque boîte de liquide concentré fournit 520 kcal
30 mL de liquide concentré non dilué fournissent 40 kcal

Une oz liq. américaine = 29,57 mL
1 c. à soupe d'eau = 15 mL d'eau

Pour les instructions concernant la préparation, l'utilisation et la conservation, veuillez consulter la page propre à chaque produit.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Lignes directrices pour la préparation des biberons Nursette® ou de lait maternel

PRÉPARATION D'UN BIBERON DE LAIT MATERNEL OU NURSETTE® DE 59 mL - 20-30 kcal/30 mL

Ces conseils généraux sont fournis pour des raisons pratiques et basés sur les résultats obtenus après le mélange; ils n'ont pas fait l'objet d'évaluations cliniques. Pour des raisons pratiques, les mesures domestiques sont fournies lorsqu'une dilution précise n'est pas nécessaire. Au besoin, consulter les renseignements sur les mesures des produits en poudre de Mead Johnson Nutrition. Les préparations liquides concentrées non diluées fournissent 1,35 kcal/mL.

Pour chaque bébé, la densité calorique et la nature des suppléments qu'on ajoute à la préparation pour nourrisson ou au lait maternel sont laissées au jugement clinique du diététiste ou du médecin qui connait le mieux les antécédents médicaux du bébé et ses besoins nutritionnels. Il faut tenir compte de la composition nutritionnelle et de l'osmolalité avant de choisir un supplément. Introduire les changements graduellement pour réduire le risque d'intolérance.

Point de départ : 59 mL de préparation ou de lait maternel à 20 kcal/30 mL

Choisir un supplément :

Objectif	Préparation en poudre*	Préparation liquide concentrée
22 kcal/30 mL	0,9 g	7 mL (~ 1½ c. à thé)
24 kcal/30 mL	1,8 g	15 mL (~ 1 c. à soupe)
27 kcal/30 mL	3,2 g	32 mL (~ 2 c. à soupe)

Point de départ : 59 mL de préparation à 22 kcal/30 mL

Choisir un supplément :

Objectif	Eau	Préparation en poudre*	Préparation liquide concentrée
20 kcal/30 mL	6 mL (~ 1 c. à thé)	--	--
24 kcal/30 mL	--	0,9 g	7 mL (~ 1½ c. à thé)
27 kcal/30 mL	--	2,3 g	23 mL (~ 1 c. à soupe + 1½ c. à thé)
30 kcal/30 mL	--	3,8 g	47 mL (~ 3 c. à soupe)

Point de départ : 59 mL de préparation ou de lait maternel fortifié à 24 kcal/30 mL

Choisir un supplément :

Objectif	Eau	Préparation en poudre*	Préparation liquide concentrée
20 kcal/30 mL	12 mL (~ 2½ c. à thé)	--	--
22 kcal/30 mL	5,5 mL (1 c. à thé)	--	--
27 kcal/30 mL	--	1,4 g	14 mL (~ 1 c. à soupe)
30 kcal/30 mL	--	2,8 g	35 mL (~ 2 c. à soupe + 1 c. à thé)

*** Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas commercialement stériles et ne devraient pas être servies aux bébés immunodéprimés, sauf si la situation clinique l'exige. Si tel est le cas, ces préparations doivent être préparées et utilisées sous étroite surveillance médicale.[1]**

1. International Formula Council. *Infant Feeding: Safety Issues for Health Care Professionals*. Atlanta, GA: International Formula Council; 2004:4.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil A+®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/la boite pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

CONTENANT: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

BOITE: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d'Enfamil A+ réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ seulement.Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil®, Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®, Enfamil A+® Soya et Enfamil A+® Sans Lactose

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil A+ Gentlease®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/la boite pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

CONTENANT: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ Gentlease seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

BOITE: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d'Enfamil A+ Gentlease réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ Gentlease seulement.Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil® A+® EnfaCare®

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. N'utilisez que selon les instructions d'un professionnel de la santé. Une hygiène, une préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer de sévères dommages. Bien que cette poudre soit conçue pour les nourrissons prématurés, les préparations pour nourrissons en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou possiblement immunodéprimés, sauf si cela est prescrit et supervisé par le médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**.

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la tétée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil A+® Épaissie

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN. LAISSER REPOSER LE BIBERON 5 MINUTES.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la tétée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Nutramigen® A+®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: PURAMINO™ A+®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin quelle préparation convient à votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, la mésure et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
Biberon de **65 mL**	**60 mL** (1/4 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
Biberon de **130 mL**	**120 mL** (1/2 tasse)	**4 mesures** rases non tassées
Biberon de **195 mL**	**180 mL** (3/4 tasse)	**6 mesures** rases non tassées
Biberon de **260 mL**	**240 mL** (1 tasse)	**8 mesures** rases non tassées

1 mesure rase non tassée de poudre correspond à 4,5 g. Chaque mesure ajoute environ 3 mL à la quantité de préparation apprêtée.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Ne pas réfrigérer le biberon après le début de la tétée. La préparation apprêtée restant dans le biberon entamé doit être jetée dans un délai d'une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Pregestimil® A+®

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. N'utilisez que selon les instructions d'un professionnel de la santé. Une hygiène, une préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer de sévères dommages. Bien que cette poudre soit conçue pour les nourrissons prématurés, les préparations pour nourrissons en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou possiblement immunodéprimés, sauf si cela est prescrit et supervisé par le médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).

2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes**.** Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger.

3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez la poudre. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Pour obtenir	Eau bouillie	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil A+® 2

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui. Demandez au médecin de votre bébé s'il est nécessaire d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie pour apprêter la préparation et de faire bouillir la mesure, les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de les utiliser.

1. Lavez bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Verser la quantité d'eau dans la bouteille. Ajouter la poudre.	3. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **BIEN AGITER.**

Le tableau ci-dessous indique les quantités d'eau et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant/la boite pour mesurer la poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans le contenant/le sachet.

Pour obtenir	Eau	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

CONTENANT: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ 2 seulement. Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

BOITE: Conservation/manipulation : Conserver la poudre à la température ambiante. Éviter les températures extrêmes. Des sachets de rechange peuvent être utilisés avec les contenants d'Enfamil A+ 2 réutilisables, vendus séparément. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Utiliser le contenant avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ 2 seulement.Pour préserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l'essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l'ouverture d'un nouveau sachet, conserver l'autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d'utilisation jusqu'à l'utilisation complète du sachet.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfamil® 2

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de especter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne devraient pas être données à des nourrissons prématurés ou immunodéprimés, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin de votre bébé. Demandez au médecin de votre bébé quelle préparation est appropriée pour lui. Demandez au médecin de votre bébé s'il est nécessaire d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie pour apprêter la préparation et de faire bouillir la mesure, les ustensiles, les biberons et les tétines propres avant de les utiliser.

1. Lavez bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Verser la quantité d'eau dans la bouteille. Ajouter la poudre.	3. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **BIEN AGITER.**

Utiliser le tablearu ci-dessous pour les proportions indiquées d'eau et de poudre. Utiliser la mesure fournie dans la boîte pour mesurer la poudre. Conserver la mesure **SÈCHE** dans cette boîte.

Pour obtenir	Eau	Poudre
60 mL biberon	**60 mL** (1/4 tasse)	**1 mesure** rase non tassée
120 mL biberon	**120 mL** (1/2 tasse)	**2 mesures** rases non tassées
180 mL biberon	**180 mL** (3/4 tasse)	**3 mesures** rases non tassées
240 mL biberon	**240 mL** (1 tasse)	**4 mesures** rases non tassées

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque alors de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température ambiante. Recouvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Poudre: Enfagrow® A+® (saveur de lait et vanille)

Enfagrow® A+® est destiné aux enfants de 1 à 3 ans et n'est pas destiné aux enfants de moins d'un an.

Mode d'emploi

Pour préparer 1 portion (200 mL), ajouter 4 mesures rases de poudre non tassée à 175 mL d'eau tiède. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse. Réfrigérer et utiliser dans les 48 heures.

Conservation : Après son ouverture, la boîte doit être bien couverte et conservée à la température de la pièce dan un endroit sec. Conserver la mesure **SÈCHE** dans cette boîte.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Concentré: Enfamil A+®, Enfamil®, Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®, et Enfamil A+® Sans Lactose

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues, ouvre-boîtes et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faites bouillir de l'eau douce à forte ébullition pendant 2 minutes. Laissez refroidir à la température ambiante avant de mélanger. Nettoyez le dessus de la boîte avec de l'eau bouillie au préable, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau refroidie appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité **égale** de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Concentré: Enfamil A+® 2 et Enfamil® 2

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utiliser selon les instructions de votre médecin.

1. Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon avant d'apprêter la préparation.	2. Nettoyez le dessus de la boîte, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Versez la quantité d'eau appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité égale de liquide concentré. Vissez le couvercle du biberon et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Prête à l'emploi : Enfamil A+®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé. Vérifiez chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. **AGITEZ BIEN LA BOUTEILLE**, enlevez le sceau protecteur autour du couvercle, puis retirez le couvercle et l'opercule en aluminium.	3. Versez dans le ou les biberons. Recouvrez le biberon de son couvercle et **AGITEZ BIEN**.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des bouteilles ouvertes et des biberons apprêtés peut se gâter rapidement. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation: Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Prête à l'emploi : Nutramigen® A+®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utiliser la préparation selon les directives du médecin.

1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation. Faites bouillir les biberons, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Nettoyer le dessus de la boîte avec de l'eau bouillie au préable, **AGITEZ BIEN** la boîte et ouvrez-la.	3. Verser dans la ou les bouteilles. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **AGITEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des boîtes ouvertes et la préparation apprêtée sont hautement périssables. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 48 heures. Ne pas utiliser la boîte ouverte ou la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation pour nourrissons. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Biberons : Enfamil A+®, Enfamil A+® Hypercalorique 24 kcal, Enfamil A+® Avec Fer pour prématurés 20 kcal, Enfamil A+® pour prématurés 20 kcal, Enfamil® A+® EnfaCare®, Nutramigen® A+®, Pregestimil® A+®, Enfamil A+® Sans Lactose, Enfamil A+® Soya, Enfamil A+® pour prématurés 24 kcal, Enfamil A+® Avec Fer pour prématurés 24 kcal, Enfamil® A+® pour prématurés hyper protéinée

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement de la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifier chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. **BIEN AGITER LA BOUTEILLE** et retirer le couvercle.	3. Fixer une TÉTINE JETABLE (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtées, les bouteilles ouvertes sont hautement périssables. Servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler.

Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Eau Enfamil®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement d'aliments pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifier chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Retirer le couvercle.	3. Fixer une TÉTINE JETABLE (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Après ouverture, servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer l'eau, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser pour l'alimentation parentérale (intraveineuse).

Cette eau est préte à consommer comme eau de boisson ou à d'autres fins orales selon les instructions de votre médecin.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Eau glucosée à 5 % Enfamil®

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage lors de l'apprêtement d'aliments pour nourrissons. Utilisez selon les instructions de votre médecin.

Vérifier chaque bouteille pour voir si elle a été endommagée.

1. Bien se laver les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.	2. Retirer le couvercle.	3. Fixer une TÉTINE JETABLE (non incluse) ou demander au médecin de son bébé s'il est nécessaire de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation.

Après ouverture, servir immédiatement ou replacer le couvercle et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer l'eau, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Conservation : Conserver les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser pour l'alimentation parentérale (intraveineuse).

NE PAS UTILISER SI LA BAGUE DU COUVERCLE EST ENDOMMAGÉE OU ABSENTE

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Phenyl-Free® 1

La préparation **Phenyl-Free® 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment de phénylalanine en offrant aussi des aliments qui contiennent cet acide aminé, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de PHENYL-FREE 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et **BIEN AGITER.**

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

* Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Phenyl-Free® 2 Préparation en poudre sans phénylalanine

La préparation **PHENYL-FREE® 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter PHENYL-FREE® 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment de phénylalanine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi: Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **PHENYL-FREE® 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,4 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Phenyl-Free® 2HP Préparation en poudre riche en protèines et sans phénylalanine

La préparation **PHENYL-FREE® 2HP de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de phénylcétonurie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter PHENYL-FREE® 2HP avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment de phénylalanine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emlpoi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **PHENYL-FREE® 2HP. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 15,1 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois.

Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive**.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

TYROS 1

La préparation **TYROS 1de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants atteints de tyrosinémie, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment de phénylalanine et de tyrosine en offrant aussi des aliments qui contiennent ces acides aminés, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de TYROS 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et l'agiter vigoureusement.

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

* Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

TYROS 2 Préparation en poudre sans phénylalanine ni tyrosine

La préparation **TYROS 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme de la tyrosine, y compris de tyrosinémie de type II, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter TYROS 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment de tyrosine et de phénylalanine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **TYROS 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

BCAD 1

La préparation **BCAD 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment d'isoleucine, de leucine et de valine en offrant aussi des aliments qui contiennent ces acides aminés, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de BCAD 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et l'agiter vigoureusement.

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

* Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

BCAD 2 Préparation en poudre sans isoleucine, leucine ni valine

La préparation **BCAD 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable ou d'autres troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter BCAD 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant fournir suffisamment d'isoleucine, de leucine et de valine pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **BCAD 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,5 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois.

Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

PFD 1

La préparation **PFD 1 de Mead Johnson** ne doit servir qu'à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants chez qui on a confirmé la présence de troubles héréditaires du métabolisme des acides aminés, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Afin d'assurer une bonne croissance, il est important de fournir suffisamment de protéines et d'acides aminés en offrant aussi des aliments qui contiennent des protéines, selon les besoins. Les professionnels de la santé doivent superviser attentivement et constamment l'emploi de PFD 1 avec d'autres aliments et liquides et ajuster l'alimentation en fonction des résultats de fréquentes analyses de sang.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION

Suivez attentivement les instructions suivantes, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de prendre les mesures d'hygiène, de préparation, de dilution, d'utilisation et de conservation qui s'imposent au moment d'apprêter la préparation. Les préparations en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes immunodéprimées, sauf en cas de prescription et sous la surveillance du médecin qui s'occupe de votre bébé.

1. Laver bien les mains. Faire bouillir les bouteilles, tétines, bagues et ustensiles propres dans de l'eau (2 minutes à forte ébullition).	2. Faire bouillir de l'eau fraîche à forte ébullition pour 2 minutes. Laisser refroidir à la température de la pièce avant de mélanger.	3. Verser la quantité désirée d'eau refroidie dans la bouteille. Ajouter la poudre. Recouvrir la bouteille de son couvercle et l'agiter vigoureusement.

Le médecin qui s'occupe de votre bébé vous indiquera les quantités d'eau et de poudre à utiliser*. Versez la quantité d'eau nécessaire dans le biberon. Ajoutez la bonne quantité de poudre, fermez le biberon et agitez vigoureusement.

* Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient environ 4,5 g de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation peut se gâter rapidement. Servir la préparation immédiatement ou la couvrir et la conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant 24 heures maximum. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle n'a pas été réfrigérée depuis plus de 2 heures. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation inutilisée après une heure.

MISE EN GARDE : Ne pas chauffer la préparation au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.

CONSERVATION : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

PFD 2 Préparation en poudre sans protéines ni acides aminés

La préparation **PFD 2 de Mead Johnson Nutrition** ne doit servir qu'à l'alimentation des enfants et des adultes chez qui on a confirmé la présence de troubles du métabolisme des acides aminés, sous la supervision directe et constante d'un médecin.

MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas complet sur le plan nutritionnel. Une supervision médicale constante et des analyses de sang fréquentes sont exigées. Il faut compléter PFD 2 avec d'autres sources alimentaires contenant des protéines et des liquides pouvant répondre aux besoins nutritionnels des enfants et des adultes.

Mode d'emploi : Votre professionnel de la santé vous indiquera la bonne quantité de poudre à mélanger avec de l'eau pour la consommation*. Il est important de suivre les instructions ci-dessous.

Dans un contenant approprié, mesurer la bonne quantité d'eau à mélanger. Ajouter ensuite la quantité nécessaire de **PFD 2. Bien mélanger.** Consommer immédiatement la boisson apprêtée ou la couvrir et la réfrigérer. Consommer dans les 48 heures suivant la préparation. Mélanger avant de boire.

*Si l'on vous indique d'utiliser la mesure se trouvant dans la boîte, sachez qu'une mesure rase non tassée contient **environ 14,9 g** de poudre. Conservez la mesure **SÈCHE** dans la boîte.

CONSERVATION DE LA POUDRE : Conserver les boîtes à la température ambiante. Couvrir hermétiquement les boîtes ouvertes, les conserver dans un endroit sec et les utiliser dans un délai de 1 mois. Il ne faut pas congeler la poudre ni l'exposer à une chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Mode d'emploi

Portagen®

UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE DIÉTÉTISTE.

LA POUDRE PORTAGEN® N'EST PAS CONÇUE POUR SERVIR DE PRÉPARATION POUR NOURRISSONS. La poudre Portagen® est une source de protéines, lipides et glucides facile à digérer qui peut être servie en tant que supplément nutritif sous forme de breuvage.

La poudre Portagen® n'est pas conçue en tant que seule source nutritionnelle. Pour l'usage prolongé, un supplément d'acides gras essentiels et des minéraux à l'état d'ultra-trace devrait être considéré. N'utiliser que selon les directives de votre médecin.

MISE EN GARDE : Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé du consommateur en dépend. N'utiliser que selon les instructions d'un professionnel de la médecine. Une hygiène, une préparation, une dilution, un usage ou un entreposage inappropriés peuvent causer de sévères dommages. Les préparations alimentaires en poudre ne sont pas stériles et ne devraient pas être servies à des nourrissons prématurés ou à des personnes possiblement immunodéprimés sauf si cela est prescrit et supervisé par un professionnel de la médecine.

- Pour 946 mL (32 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 1 2/3 tasses de poudre tassée à niveau (204 g) à 790 mL (27 oz liq. US) d'eau.*
- Pour approximativement 131 mL (4.5 oz liq. US) de produit apprêté, ajouter 3 mesures rases tassées (28,2 g) à 110 mL (3,5 oz liq. US) d'eau.*
- Les deux préparations fourniront 30 kcal / 30 mL de produit apprêté. Pour d'autres quantités, suivre les directives de votre médecin.
- Verser la quantité d'eau désirée dans un récipient approprié. Ajouter la poudre et mélanger vigoureusement jusqu'au mélange complet.

Le défaut de suivre ces instructions pourrait causer de sévères dommages. Une fois apprêté, le produit est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur à 2-4 °C (35-40 °F) pour un maximum de 24 heures. Bien agiter avant chaque usage. Le produit apprêté ne doit pas être utilisé s'il est demeuré plus de 2 heures sans être réfrigéré. Ne pas congeler le produit apprêté. Ne pas réfrigérer le contenant après qu'il a été entamé. Le produit apprêté restant dans le contenant entamé doit être jeté dans un délai d'une heure.

Conservation de la poudre : Conserver les boîtes à la température de la pièce. Après son ouverture, la boîte doit être recouverte hermétiquement, conservée dans un endroit sec et utilisée dans un délai d'un mois. Ne pas congeler la poudre et éviter la chaleur excessive.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).

*Les mesures en mL sont les plus précises pour ce qui est d'atteindre la densité calorique cible; les valeurs en oz liq. US sont des approximations et sont calculées à l'aide de facteurs de conversion américains.

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Nom du produit

Nom du produit	Unité
BCAD 1	454 g
BCAD 2	454 g
Biberons en plastique prêts à l'emploi	—
Biberon pour Nourrissons Présentant une Fissure Labio-Palatine	—
Bouchons Grad-U-Feed®	—
Contenant Grad-U-Feed®	—
Contenant pour la conservation du lait maternel	300 mL
Contenant Snappies® pour la conservation du lait maternel	70 mL
Eau Enfamil®	59 mL
Eau Glucosée à 5 % Enfamil®	59 mL
Enfagrow® A+® saveur de lait	680 g
Enfagrow® A+® vanille	680 g
Enfamil A+®	235 mL
Enfamil A+®	385 mL
Enfamil A+®	59 mL
Enfamil A+®	663 g
Enfamil A+®	2 x 496 g (992 g)
Enfamil A+® Épaissie	660 g
Enfamil A+® hypercalorique	59 mL
Enfamil A+® Sans Lactose	385 mL
Enfamil A+® Sans Lactose	730 g
Enfamil A+® Sans Lactose	59 mL
Enfamil A+® Soya	59 mL
Enfamil A+® Soya	730 g
Enfamil A+ Gentlease®	629 g
Enfamil A+ Gentlease®	2 x 471 g (942 g)
Enfamil®	385 mL
Enfamil®	900 g
Enfamil® A+® avec fer pour prématurés 20 kcal	59 mL
Enfamil® A+® avec fer pour prématurés 24 kcal	59 mL
Enfamil® A+® pour prématurés 20 kcal	59 mL
Enfamil® A+® pour prématurés 24 kcal	59 mL
Enfamil® A+® pour prématurés hyper protéinée	59 mL
Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)	50 mL
Enfamil® A+® EnfaCare®	363 g
Enfamil® A+® EnfaCare®	59 mL
Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)	250 mL
Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)	50 mL

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Nom du produit

Nom du produit	Unité
Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®	385 mL
Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®	900 g
Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)	50 mL
Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide)	50 mL
Enfamil® 2	900 g
Enfamil® 2 (Concentré)	385 mL
Enfamil A+® 2	550 g
Enfamil A+® 2	2 x 496 g (992 g)
Enfamil A+® 2 (Concentré)	385 mL
Fortifiant de lait maternel Enfamil®	0.71 g/sachet
Nutramigen® A+®	454 g
Nutramigen® A+®	945 mL
Nutramigen® A+®	59 mL
PFD 1	454 g
PFD 2	454 g
Phenyl-Free® 1	454 g
Phenyl-Free® 2	454 g
Phenyl-Free® 2 HP	454 g
Portagen®	454 g
Pregestimil® A+®	454 g
Pregestimil® A+®	59 mL
PURAMINO™ A+®	400 g
Solution orale Enfamil® Enfalyte^MC pour le maintien de l'équilibre électrolytique	177 mL
Sucette Orthodontique pour Nouveau-né NUK®	—
Tétine Enfamil® à Orifice Cruciforme	—
Tétine Enfamil® Pour Nouveau-né	—
Tétine Enfamil® Souple à Débit Lent	—
Tétine Enfamil® Souple à Débit Standard	—
Tétine Orthodontique pour Nouveau-né NUK®	—
TYROS 1	454 g
TYROS 2	454 g

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article

N° d'article	Produit	Unité
1014765	Biberons en plastique prêts à l'emploi	n/a
1014815	Contenants Grad-U-Feed®	n/a
1015154	Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)	50 mL
1015245	Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide)	50 mL
1015277	Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)	50 mL
1015278	Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)	250 mL
1015280	Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)	50 mL
1015429	Enfamil® 2 (Concentré)	385 mL
1015435	Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®	385 mL
1015439	Enfamil®	385 mL
1015466	Biberon pour Nourrissons Présentant une Fissure Labio-Palatine	n/a
1015473	Tétine Orthodontique pour Nouveau-né NUK®	n/a
1015474	Sucette Orthodontique pour Nouveau-né NUK®	n/a
1015655	Tétine Enfamil® Pour Nouveau-né	n/a
1015664	Tétine Enfamil® à Orifice Cruciforme	n/a
1053582	Bouchons Grad-U-Feed®	n/a
1171320	Enfamil® A+® EnfaCare®	363 g
1173080	Fortifiant de lait maternel Enfamil®	0.71 g/sachet
1175249	Portagen®	454 g
1177073	Enfamil A+® Épaissie	660 g
1208370	Tétine Enfamil® Souple à Débit Standard	n/a
1208371	Tétine Enfamil® Souple à Débit Lent	n/a
1210915	Enfamil A+® hypercalorique	59 mL
1215246	Enfamil® A+® pour prématurés 24 kcal	59 mL
1215248	Enfamil® A+® avec fer pour prématurés 24 kcal	59 mL
1215250	Eau Enfamil®	59 mL
1215387	Enfamil® A+® EnfaCare®	59 mL
1216351	Eau Glucosée à 5% Enfamil®	59 mL
1233036	Contenant Snappies® pour la conservation du lait maternel	n/a
1233351	PURAMINO™ A+®	400 g
1238161	Pregestimil® A+®	454 g
1239201	Nutramigen A+®	454 g
1241233	Enfamil A+® Sans Lactose	730 g
1241759	Nutramigen A+®	945 mL
1241760	Enfamil A+® Sans Lactose	385 mL
1242610	Enfamil A+® Soya	730 g
1250747	Enfamil® A+® avec fer pour prématurés 20 kcal	59 mL
1250748	Enfamil® A+® pour prématurés 20 kcal	59 mL

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

N° d'article

N° d'article	Produit	Unité
1269779	Enfamil A+®	59 mL
1269807	Enfamil A+®	385 mL
1271623	Enfamil A+® Sans Lactose	59 mL
1271716	Enfamil A+® Soya	59 mL
1272691	Nutramigen® A+®	59 mL
1273987	Pregestimil® A+®	59 mL
1274013	Enfamil® 2	900 g
1274014	Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®	900 g
1274015	Enfamil®	900 g
1278787	Enfamil A+ Gentlease®	2 x 471 g (942 g)
1278788	Enfamil A+ Gentlease®	629 g
1278789	Enfamil A+®	2 x 496 g (992 g)
1278790	Enfamil A+®	663 g
1281250	Enfamil® A+® pour prématurés hyper protéinée	59 mL
1281334	Phenyl-Free® 2 HP	454 g
1281335	Phenyl-Free® 2	454 g
1281386	BCAD 2	454 g
1281389	PFD 2	454 g
1281396	TYROS 2	454 g
2001922	Phenyl-Free® 1	454 g
2001927	PFD 1	454 g
2001952	BCAD 1	454 g
2001957	TYROS 1	454 g
2005350	Enfamil A+®	235 mL
2005350	Contenant pour la conservation du lait maternel	300 mL
2014689	Enfamil A+® 2	2 x 496 g (992 g)
2014690	Enfamil A+® 2	550 g
2015336	Enfamil A+® 2 (Concentré)	385 mL
2015852	Enfagrow® A+® vanille	680 g
2015854	Enfagrow® A+® saveur de lait	680 g
2021478	Solution orale Enfamil® Enfalyte[MC]	177 mL

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Indications

Produit
Préparation courante
Enfamil A+®
Enfamil®
Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®
Préparation de suivi
Enfamil A+® EnfaCare®
Préparation de transition
Enfamil A+® 2
Enfamil® 2
Remplacement de premier choix
Enfamil A+ Gentlease®
Régurgitent
Enfamil A+® Épaissie
Sans lactose
Enfamil A+® Sans Lactose
Soya
Enfamil A+® Soya
Allergie aux protéines du lait de vache
Nutramigen® A+®
Allergie grave aux protéines du lait de vache
PURAMINO™ A+®
Malabsorption des graisses
Pregestimil® A+®
Supplément nutritionnel pour tout-petits
Enfagrow® A+®
Supplément de vitamine D
Enfamil® D-Vi-Sol®
Supplément multivitaminique
Enfamil® Tri-Vi-Sol®
Enfamil® Poly-Vi-Sol®
Carence en fer
Enfamil® Fer-In-Sol®

Mise à jour : août 2015 | Réservé aux professionnels médicaux canadiens.
© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.

Indications
Casher

Les produits suivants de Mead Johnson Nutrition sont fabriqués sous la surveillance de la Division de Kashruth de l'union des rassemblements juifs orthodoxes de l'Amérique.

Produit	
Eau Enfamil®	O.U. Parève*
Eau Glucosée à 5% Enfamil®	O.U. Parève*
Enfagrow® A+®	O.U.D.
Enfamil A+®	O.U.D.
Enfamil A+® Épaissie	O.U.D.
Enfamil A+® hypercalorique	O.U.D.
Enfamil A+® Sans Lactose	O.U.D.
Enfamil A+® Soya (poudre)	O.U. Parève
Enfamil A+ Gentlease®	O.U.D.
Enfamil®	O.U.D.
Enfamil® A+® avec fer pour prématurés 20 kcal	O.U.D.
Enfamil® A+® avec fer pour prématurés 24 kcal	O.U.D.
Enfamil® A+® pour prématurés 20 kcal	O.U.D.
Enfamil® A+® pour prématurés 24 kcal	O.U.D.
Enfamil® A+® pour prématurés 24 kcal hyper proteinée	O.U.D.
Enfamil® D-Vi-Sol® (Liquide)	O.U.
Enfamil® A+® EnfaCare®	O.U.D.
Enfamil® Fer-In-Sol® (Liquide)	O.U.
Enfamil® Fer-In-Sol® (Sirop)	O.U.
Enfamil® Plus Faible en Fer que les autres préparations Enfamil®	O.U.D.
Enfamil® Poly-Vi-Sol® (Liquide)	O.U.
Enfamil® Tri-Vi-Sol® (Liquide)	O.U.
Enfamil® 2	O.U.D.
Enfamil A+® 2	O.U.D.
Fortifiant de lait maternel Enfamil®	O.U.D.
Solution orale Enfamil® Enfalyte^MC	O.U. Parève*
Portagen	O.U.D.

* Ingrédients parèves; installations laitières utilisées.

© 2015 Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Tous droits réservés.